

Elementarteilchenphysik

→ Teilchen (WS 08/09)

YS, E6-118 (Sprecht. 17. 16-18 u.n.V.), 6211

www.physik.uni-bielefeld.de/newyork/teilchen

Gutten, CERN-Mitteilung? ; lang Nacht? ; alle im KVV?

1.0 Organisatorisches

Vorl 17. 14.15 - 16 (201-249) Stuf: 13. Okt. 08

17: 10.15 - 12

Üb Do 16.15 - 18 (206-135) entl.: Do 8-10; 10-12; 16-20
Fr 10-12; 11-13; 15-17; 16-18

Start: 23. Okt. 08

Regeln V Anw + Ü Anw + Ü abh (Vorlesung) + mtl. Prüf

13LP

16LP

19LP

Literatur

5. Semesterapparat
2.B. Griffiths, Elementarteilchenphysik (Standard Model)

Cottingham/Greenwood, Introduction to the SM of Particle Physics

Becker/Reidelt, Introduction to Relativistic Kinematics and the SM of EW Interactions

Neftci, Phenomena and Concepts in Elementary Particle Physics
Hahn/Martin, Quarks and Leptons

Burgess/Moore, The SM

2. Gast-Prof E6, WS 08/09

Bibliothek OE 200 : neuere...

(check Index jedes Buches auf "Majorana" vor Kauf)

1.1 Einleitung

Buch dieses Vorl:

Formulierung der Theorie des Standardmodells (SM)

(Quanten-) Feldtheorie, Feynmanregeln

Phänomenologie des SM

Empirische quantitative Aussagen herleiten

z.B. Wirkungsquerschnitte, Zerfallsraten ~ 10¹⁰ St/s

Diskussion von Ideen zur Erweiterung des SM

Was diese Vorl nicht bietet

Quantenfeldtheorie (→ SS 2009; n.b. Sem.)

Historische Entwicklung des SM (→ S. z.B. Griffiths, S. 13-52)

Beschreibung der experimentellen Apparaturen + Daten (→ S. z.B. [Reidels])

als bloßes Appetit: → [Einleitung.pdf]

(3 Teilchen, Wechselwirkungen; SM)

unbekannte Teile des SM

- Higgs-Boson
gibt den anderen Teilchen Masse
könnte schwer sein; exp. Suche läuft ($E = mc^2$)
- Neutrinospektrum über Neutrinos ν
könnte Bedeutung für Expansionsrate des Universums haben
viele Experimente zur Massenbestimmung

Fragen, die über das SM hinausgehen

- Quantengravitation?
wichtig z.B. in Zusammenhang von Schwarzen Löchern
- (mathematische) Eleganz?
warum drei Familien / verschiedene $U(1)$ / verschiedene $U(1)$ / verschiedene $U(1)$ / ...
- SM bricht bei sehr hohen E zusammen.
Poller von "Dingen" in QFT-Rechnungen

Ideen jenseits des SM

- Stringtheorie
Teilchen $\rightarrow$ Fäden + Vibrationen
 $\Rightarrow$ Quantengrav. (?) ; $\exists$ zusätzliche Dimensionen
 $\hookrightarrow$ exp. Nachweis?!
- Supersymmetrie
Teilchen $\rightarrow$ 2x Teilchen; Fermionen $\leftrightarrow$ Bosonen
könnten "Dunkle Materie" sein
 $\hookrightarrow$ exp. Nachweis?!
- GUT's
mehrfach. Struktur des SM vereinheitlichen / beibehalten
sagt z.B. Instabilität des Protons voraus $\leftarrow$ exp. Nachweis?!

1.2 Inventar des SM

$\rightarrow$ offizielle Liste der Elementarteilchen + deren Eigenschaften:
Particle Data Group; pdg.lbl.gov $\rightarrow$ [pdgExamplePage.pdf]

Eigenschaften?

Masse

Lebensdauer bzw. Zerfallsrate

Zerfallskanäle ($\leftarrow$ bestimmt die W 's des SM)
innere Struktur bzw. Quantenzahlen

Spin (Eigendrehimpuls) J ($\leftarrow$ Fermionen $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$
Bosonen $0, 1, \dots$)

el. Ladung Q (in Einheiten von e)

Parität $P = \pm 1$

Ladungskonjugation $C = \pm 1$

Flavor-Quantenzahlen

Isospin I_3 ($\leftarrow +\frac{1}{2}(u), -\frac{1}{2}(d)$)

Strangeness S ($\leftarrow -1(s), 0(\text{sonst})$)

Charmness C ($\leftarrow +1(c), -1$)

Bottomness B ($\leftarrow -1(b), +1$)

Topness T ($\leftarrow +1(t), -1$)

Leptonenzahl L ($\leftarrow +1(e, \mu, \tau, \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau), -1$)

Baryonenzahl B ($\leftarrow +\frac{1}{3}(u, d, s, t, b), -\frac{1}{3}$)

$\rightarrow$ einige der Quantenzahlen sind bei allen Reaktionen
erbt erhalten, einige nur in der starken W .

Anferteilchen?

Masse, Lebensdauer, Spin wie Teilchen

andere Quantenzahlen meist entgegengesetzt

Bezeichnung: z.B. $\bar{p}, \bar{n}, \bar{\nu}_e, e^+, \mu^+, \dots$

Hadronen (unterliegen der starken W)

Mesonen $q\bar{q}$ -Systeme, z.B. $\pi^+(u\bar{d}), K^0(d\bar{s}), \dots$ } viele!

Baryonen qqq -Systeme, z.B. $p(uud), n(udd), \dots$ } $\rightarrow$ PDE

Leptonen (Spin $\frac{1}{2}$ aber nicht)

e^-, μ^-, τ^- ; ν_e, ν_μ, ν_τ

1.3 Einheiten

früher: CGS (centimeter - gram - second)
 → MKS (Meter - Kilogramm - Sekunde)
 A (Ampere)

heute man setzt SI (Système International d'unités)

Energie SI: $J = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
 Teilchenphys.: $eV = 1.602 \cdot 10^{-19} CV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$
 $1 GeV = 10^9 eV$

Impuls SI: $|\vec{p}| = \frac{kg \cdot m}{s}$
 Teilchenphys.: $E = \sqrt{(mc)^2 + (\vec{p}c)^2}$
 $\approx m_{neu} ; [\vec{p}_{neu}] = GeV$

Masse $\approx m_{neu} ; [m_{neu}] = GeV$

Geschwindigkeit $v_{neu} = \frac{p_{neu} \cdot c}{E} = \frac{v_{alt} \cdot c}{E} = \beta_{alt}$

Lebensdauer $[\tau] = s$
 Zerfallsrate $\Gamma \equiv \frac{1}{\tau} ; [\Gamma] = \frac{1}{s}$ (neu: s.a.)

Länge $[\ell] = f_m = f_{neu} = 10^{-15} m$

wir wissen aus QFT: Länge $\hat{=}$ Impuls
 $\vec{p}_{alt} = \hbar \vec{k} = \hbar \frac{2\pi}{\lambda_{alt}} \vec{e}_k ; \hbar = \frac{h}{2\pi}$ ← Physische Konst.

$$h_{neu} = \frac{h_{alt}}{\hbar c} \quad \text{z.B.} \quad \frac{f_m}{\hbar c} = \frac{10^{-15} m}{1.0546 \cdot 10^{-34} Js \cdot 2.9979 \cdot 10^8 m/s} = \frac{1}{197.3 GeV}$$

($\Rightarrow GeV \cdot fm \approx 5 \hbar c$)

Zerfallsrate $\Gamma_{neu} \equiv \hbar \Gamma_{alt} ; \text{z.B.} \quad \frac{\hbar}{10^{-23} s} = \frac{10^{23}}{s} \cdot 1.0546 \cdot 10^{-34} Js = 658 MeV$

Temperatur $T_{neu} \equiv k_B T_{alt} ; \text{z.B.} \quad 10^4 K \cdot k_B = 10^4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} = 0.861 eV$

$\Rightarrow$ ab jetzt: wir schreiben alle Gr. in den neuen Größen

alles hat Dimension von Energie

"natürliche Einheiten", $\boxed{\hbar = c = k_B = 1}$



PHYSICS LETTERS B

REVIEW OF PARTICLE PHYSICS

July 2008

COMPLETE VOLUME

Available online at

ScienceDirect
 www.sciencedirect.com

<http://www.elsevier.com/locate/physletb>

LEPTONS

[e]

$$J = \frac{1}{2}$$

$$\text{Mass } m = (548.5799043 \pm 0.00000023) \times 10^{-6} \text{ u}$$

$$\text{Mass } m = 0.510998910 \pm 0.000000013 \text{ MeV}$$

$$|m_{\mu^+} - m_{\mu^-}|/m < 8 \times 10^{-9}, \text{ CL} = 90\%$$

$$|q_{\mu^+} + q_{\mu^-}|/e < 4 \times 10^{-8}$$

Magnetic moment anomaly

$$(g-2)/2 = (1159.6521811 \pm 0.00000007) \times 10^{-6}$$

$$(g_{\mu^+} - g_{\mu^-})/2 = (-0.5 \pm 2.1) \times 10^{-12}$$

$$\text{Electric dipole moment } d = (0.07 \pm 0.07) \times 10^{-26} \text{ e cm}$$

$$\text{Mean life } \tau > 4.6 \times 10^{26} \text{ yr, CL} = 90\% [a]$$

[μ]

$$J = \frac{1}{2}$$

$$\text{Mass } m = 0.1134289256 \pm 0.0000000029 \text{ u}$$

$$\text{Mass } m = 105.658367 \pm 0.000004 \text{ MeV}$$

$$\text{Mean life } \tau = (2.197019 \pm 0.0000021) \times 10^{-6} \text{ s } (S = 1.1)$$

$$\tau_{\mu^+}/\tau_{\mu^-} = 1.00002 \pm 0.00008$$

$$\tau_{\mu^+} = 658.650 \text{ ns}$$

Magnetic moment anomaly $(g-2)/2 = (11559208 \pm 6) \times 10^{-10}$

$$(g_{\mu^+} - g_{\mu^-})/2 = (-0.11 \pm 0.12) \times 10^{-6}$$

$$\text{Electric dipole moment } d = (3.7 \pm 3.4) \times 10^{-19} \text{ e cm}$$

Decay parameters [b]

$$\rho = 0.7509 \pm 0.0010$$

$$\delta = 0.001 \pm 0.024 (S = 2.0)$$

$$\delta = 0.7495 \pm 0.0012$$

$$\xi_{\mu^+} = 1.0007 \pm 0.0035 [c]$$

$$\xi_{\mu^+}^{\mu^+} [\rho > 0.99682, \text{ CL} = 90\% [c]]$$

$$\xi^{\mu^+} = 1.0 \pm 0.04$$

$$\xi^{\mu^-} = 1.0 \pm 0.4$$

$$\alpha/A = (0 \pm 4) \times 10^{-3}$$

$$\alpha'/A = (0 \pm 4) \times 10^{-3}$$

$$\beta/A = (4 \pm 6) \times 10^{-3}$$

$$\beta'/A = (1 \pm 5) \times 10^{-3}$$

$$\eta = 0.02 \pm 0.08$$

 $\mu^{\pm}$ modes are charge conjugates of the modes below.[e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ]

Decay parameters

See the τ Particle Listings for a note concerning τ-decay parameters.

$$\rho(e \text{ or } \mu) = 0.745 \pm 0.008$$

$$\rho(\mu) = 0.747 \pm 0.010$$

$$\rho(\mu) = 0.763 \pm 0.020$$

$$\xi(e \text{ or } \mu) = 0.985 \pm 0.030$$

$$\xi(e) = 0.994 \pm 0.040$$

$$\xi(\mu) = 1.030 \pm 0.059$$

$$\eta(e \text{ or } \mu) = 0.013 \pm 0.020$$

$$\eta(\mu) = 0.094 \pm 0.073$$

$$(\delta\epsilon)(e \text{ or } \mu) = 0.746 \pm 0.021$$

$$(\delta\epsilon)(e) = 0.734 \pm 0.028$$

$$(\delta\epsilon)(\mu) = 0.778 \pm 0.037$$

$$\xi(\tau) = 0.993 \pm 0.022$$

$$\xi(\mu) = 0.994 \pm 0.008$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

$$\xi(\tau) = 1.001 \pm 0.027$$

[e]

$$J = \frac{1}{2}$$

$$\text{Mass } m = (548.5799043 \pm 0.00000023) \times 10^{-6} \text{ u}$$

$$\text{Mass } m = 0.510998910 \pm 0.000000013 \text{ MeV}$$

$$|m_{\mu^+} - m_{\mu^-}|/m < 8 \times 10^{-9}, \text{ CL} = 90\%$$

$$|q_{\mu^+} + q_{\mu^-}|/e < 4 \times 10^{-8}$$

Magnetic moment anomaly

$$(g-2)/2 = (1159.6521811 \pm 0.00000007) \times 10^{-6}$$

$$(g_{\mu^+} - g_{\mu^-})/2 = (-0.5 \pm 2.1) \times 10^{-12}$$

$$\text{Electric dipole moment } d = (0.07 \pm 0.07) \times 10^{-26} \text{ e cm}$$

$$\text{Mean life } \tau > 4.6 \times 10^{26} \text{ yr, CL} = 90\% [a]$$

[μ]

$$J = \frac{1}{2}$$

$$\text{Mass } m = 0.1134289256 \pm 0.0000000029 \text{ u}$$

$$\text{Mass } m = 105.658367 \pm 0.000004 \text{ MeV}$$

$$\text{Mean life } \tau = (2.197019 \pm 0.0000021) \times 10^{-6} \text{ s } (S = 1.1)$$

$$\tau_{\mu^+}/\tau_{\mu^-} = 1.00002 \pm 0.00008$$

$$\tau_{\mu^+} = 658.650 \text{ ns}$$

Magnetic moment anomaly $(g-2)/2 = (11559208 \pm 6) \times 10^{-10}$

$$(g_{\mu^+} - g_{\mu^-})/2 = (-0.11 \pm 0.12) \times 10^{-6}$$

$$\text{Electric dipole moment } d = (3.7 \pm 3.4) \times 10^{-19} \text{ e cm}$$

Decay parameters [b]

$$\rho = 0.7509 \pm 0.0010$$

$$\delta = 0.001 \pm 0.024 (S = 2.0)$$

$$\delta = 0.7495 \pm 0.0012$$

$$\xi_{\mu^+} = 1.0007 \pm 0.0035 [c]$$

$$\xi_{\mu^+}^{\mu^+} [\rho > 0.99682, \text{ CL} = 90\% [c]]$$

$$\xi^{\mu^+} = 1.0 \pm 0.04$$

$$\xi^{\mu^-} = 1.0 \pm 0.4$$

$$\alpha/A = (0 \pm 4) \times 10^{-3}$$

$$\alpha'/A = (0 \pm 4) \times 10^{-3}$$

$$\beta/A = (4 \pm 6) \times 10^{-3}$$

$$\beta'/A = (1 \pm 5) \times 10^{-3}$$

$$\eta = 0.02 \pm 0.08$$

 $\mu^{\pm}$ modes are charge conjugates of the modes below.[e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ][e⁻ ν_μ ν_μ ν_μ]

2. ASTROPHYSICAL CONSTANTS AND PARAMETERS

Table 2.1. Revised May 2008 by E. Bergren and D.E. Groom (LENL). The figures in parentheses after some values give the one standard deviation uncertainties in the last digit(s). Physical constants are from Ref. 1. While every effort has been made to obtain the most accurate current values of the listed quantities, the table does not represent a critical review or adjustment of the constants, and is not intended as a primary reference. The values and uncertainties for the cosmological parameters depend on the exact data sets, priors, and basis parameters used in the fit. Many of the parameters reported in this table are derived parameters or have non-Gaussian likelihoods. The quoted errors may be highly correlated with those of other parameters, so care must be taken in propagating them. Unless otherwise specified, cosmological parameters are best fits of a spatially-flat Λ CDM cosmology with a power-law initial spectrum to WMAP 3-year data alone [2]. For more information see Ref. 3 and the original papers.

Quantity	Symbol, equation	Value	Reference, footnote
speed of light	c	$299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$	exact[4]
Newtonian gravitational constant	G_N	$6.6743(7) \times 10^{-11}\text{ m}^3\text{ kg}^{-1}\text{ s}^{-2}$	[1]
Planck mass	$\sqrt{\hbar c/G_N}$	$1.220\,89(6) \times 10^{19}\text{ GeV}/c^2$ $= 2.176\,44(11) \times 10^{-8}\text{ kg}$	[1]
Planck length	$\sqrt{\hbar G_N/c^3}$	$1.616\,24(6) \times 10^{-35}\text{ m}$	[1]
standard gravitational acceleration	g_N	$9.806\,65\text{ m s}^{-2}$	exact[1]
jansky (flux density)	Jy	$10^{-26}\text{ W m}^{-2}\text{ Hz}^{-1}$	definition
tropical year (equinox to equinox) (2007)	yr	$31\,556\,925.2\text{ s} \approx \pi \times 10^7\text{ s}$	[5]
sidereal year (fixed star to fixed star) (2007)		$31\,558\,149.8\text{ s} \approx \pi \times 10^7\text{ s}$	[5]
mean sidereal day (2007) (time between vernal equinox transits)		$23^h\,56^m\,04^s.090\,53$	[5]
astronomical unit	AU, A	$149\,597\,870\,700(3)\text{ m}$	[6]
parsec (1 AU/1 arc sec)	pc	$3.085\,677\,6 \times 10^{16}\text{ m} = 3.262 \dots \text{ly}$	[7]
light year (deprecated unit)	ly	$0.306\,6 \dots \text{pc} = 0.946\,053 \dots \times 10^{16}\text{ m}$	[8]
Schwarzschild radius of the Sun	$2G_N M_\odot/c^2$	$2.953\,250\,077\,0(2)\text{ km}$	[9]
Solar mass	$M_\odot$	$1.988\,4(2) \times 10^{30}\text{ kg}$	[9]
Solar luminosity	$L_\odot$	$6.9551(3) \times 10^{26}\text{ W}$	[10]
Solar equatorial radius	$R_\odot$	$3.842\,7(14) \times 10^8\text{ m}$	[11]
Solar luminosity	$2G_N M_\odot/c^2$	$8.870\,055\,881\text{ mm}$	[12]
Schwarzschild radius of the Earth	$M_\oplus$	$5.972\,2(6) \times 10^{24}\text{ kg}$	[13]
Earth mass	$R_\oplus$	$6.378\,137 \times 10^6\text{ m}$	[5]
Earth mean equatorial radius			[14]
luminosity conversion (deprecated)	L	$3.02 \times 10^{28} \times 10^{-0.4 M_{\text{bol}}}\text{ W}$ (M_{bol} = absolute bolometric magnitude)	
flux conversion (deprecated)	$\mathcal{F}$	$2.52 \times 10^{-8} \times 10^{-0.4 m_{\text{bol}}}\text{ W m}^{-2}$ (m_{bol} = bolometric magnitude at 10 pc)	from above
ABsolute monochromatic magnitude	AB	$(m_{\text{bol}} = \text{apparent bolometric magnitude})$ $-2.5 \log_{10} f_\nu - 56.10$ (for f_ν in $\text{W m}^{-2}\text{ Hz}^{-1}$) $= -2.5 \log_{10} f_\nu + 8.90$ (for f_ν in Jy)	[15]
Solar velocity around center of Galaxy	Θ_0	$220(20)\text{ km s}^{-1}$	[16]
Solar distance from Galactic center	R_0	$8.0(5)\text{ kpc}$	[17]
local disk density	ρ_{disk}	$3\text{--}12 \times 10^{-24}\text{ g cm}^{-3} \approx 2\text{--}7\text{ GeV}/c^2\text{ cm}^{-3}$	[18]
local halo density	ρ_{halo}	$2\text{--}13 \times 10^{-25}\text{ g cm}^{-3} \approx 0.1\text{--}0.7\text{ GeV}/c^2\text{ cm}^{-3}$	[19]
present day CMB temperature	T_0	$2.725(1)\text{ K}$	[20]
present day CMB dipole amplitude	η_γ	$3.358(17)\text{ mK}$	[21]
Solar velocity with respect to CMB	H_0	$369(2)\text{ km/s}$ towards (ℓ, b) = $(263.86(4)^\circ, 48.24(10)^\circ)$	[21]
Local Group velocity with respect to CMB	v_{LG}	$627(22)\text{ km/s}$ towards (ℓ, b) = $(276(3)^\circ, 30(3)^\circ)$	[22]
entropy density/Boltzmann constant	s/k	$2.889\,2(7/2.725)^3\text{ cm}^{-3}$	[14]
number density of CMB photons	n_γ	$410.5(7/2.725)^3\text{ cm}^{-3}$	[23]
present day Hubble expansion rate	H_0	$100\text{ h km s}^{-1}\text{ Mpc}^{-1}$ $= h \times (9.777\,752\text{ Gyr})^{-1}$	[24]
present day normalized Hubble expansion rate†	h	$0.73(3)$	[2, 3]
Hubble length	c/H_0	$0.925\,063 \times 10^{26}\text{ h}^{-1}\text{ m} \approx 1.27 \times 10^{26}\text{ m}$	
scale factor for cosmological constant	$c^2/3H_0^2$	$2.852 \times 10^{25}\text{ h}^{-2}\text{ m}^2$	
critical density of the Universe	$\rho_c = 3H_0^2/8\pi G_N$	$2.775\,366\,27 \times 10^{11}\text{ h}^2\text{ Mpc}^{-3}$ $= 1.878\,35(19) \times 10^{-28}\text{ h}^2\text{ g cm}^{-3}$ $= 1.053\,68(11) \times 10^{-5}\text{ h}^2\text{ (GeV}/c^2\text{)}\text{ cm}^{-3}$	[25]
pressureless matter density of the Universe†	$\Omega_m = \rho_m/\rho_c$	$0.128(8)\text{ h}^{-2} \approx 0.24\text{ (WMAP3)}$ $0.132(4)\text{ h}^{-2} \approx 0.27(2)\text{ (ALL mean)}$	[2, 3]
baryon density of the Universe†	$\Omega_b = \rho_b/\rho_c$	$0.0223(7)\text{ h}^{-2} \approx 0.0425$	[2, 3]
dark matter density of the Universe†	$\Omega_{\text{dm}} = \Omega_m - \Omega_b$	$0.105(8)\text{ h}^{-2} \approx 0.20$	[2, 3]
dark energy density of the Universe†	Ω_Λ	$0.73(3)$	[2, 3]
Hubble length	c/H_0	$0.925\,063 \times 10^{26}\text{ h}^{-1}\text{ m} \approx 1.27 \times 10^{26}\text{ m}$	[26]
radiation density of the Universe†	$\Omega_\gamma = \rho_\gamma/\rho_c$	$2.471 \times 10^{-5}(7/2.725)^4\text{ h}^{-2} \approx 4.6 \times 10^{-5}$	[26]
neutrino density of the Universe†	Ω_ν	$0.0005 < \Omega_\nu\text{ h}^{-2} < 0.023 \Rightarrow 0.001 < \Omega_\nu < 0.05$	[26]
total energy density of the Universe†	$\Omega_{\text{tot}} = \Omega_m + \dots + \Omega_\Lambda$	$1.011(12)$	[2, 27]

1.4 Reminder: Spez. Rel.

Elementarteilchen sind meist sehr leicht und laufen sich schnell
 → relativistische Beschreibung! $\exists$ Inertialsysteme ...
 → wichtig! [$\in$ Theorie I] [hier: Vklh.]

alle (vorh.) Coord. werden als 4-Vektoren zusammengefasst:

$$\text{Ortsvektor } x^\mu, \mu = 0, \dots, 3, \quad x^0 = t, \quad x^i = x, \quad x^2 = y, \quad x^3 = z \\ \Rightarrow x^\mu = (t, \vec{x})$$

$$\text{Vierersimpuls } p^\mu, \quad p^0 = E, \quad p^i = p_i, \quad p^2 = p_y, \quad p^3 = p_z$$

$$\Rightarrow p^\mu = (E, \vec{p}) \quad \Rightarrow \frac{d}{dt}$$

$$\text{Vierergeschwindigkeit } u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

↑ Eigenzeit des Teilchens
 "Uhrzeit" des Teilchens

$$u^\mu = \gamma(1, \vec{v}) \quad \text{mit } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \frac{dt}{d\tau} \quad \text{im Laborsystem}$$

$$\text{massive Teilchen: } p^\mu = m u^\mu \quad (\text{Def. der Masse})$$

$$\text{Relativität: } (p^\mu)_{\text{inert}} = (p^\mu)_{\text{null}} \quad \text{Vierersimpuls-Erhaltung}$$

$$\text{Ableitungen: } \partial_\nu := \frac{\partial}{\partial x^\nu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \quad \partial^\mu := \partial_{x_\mu}$$

mit Hilfe des metrischen Tensors

$$g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$$

bildet man die Skalarprodukte von 4-Vektoren:

$$a \cdot b := a_\mu b^\mu := g_{\mu\nu} a^\mu b^\nu = a^0 b^0 - a^1 b^1 - a^2 b^2 - a^3 b^3$$

Einsten'sche Summenkonvention! $\sum_{\alpha=0}^3 a_\alpha^2$

$$\text{z.B. } a^2 = a \cdot a = (a^0)^2 - a^2 \quad (\text{kann auch } < 0 \text{ sein!})$$

$a^2 < 0$ heißt "raumartig"
 > 0 heißt "zeitlich"
 $= 0$ heißt "lichtartig"

z.B. $u^2 = \gamma^2 (1^2 - \vec{v}^2) = 1$
 $\vec{p}^2 = m^2$
 $\square := \partial^\mu \partial_\mu = \partial_t^2 - \vec{\nabla}^2$

Relevanz: Skalarprodukte sind invariant

d.h. sie haben in allen Inertialsystem den gleichen Wert

lineare Transformationen Λ^μ_ν , unter denen die Skalarprodukte invariant bleiben, bilden die Lorentzgruppe

Lorentzinfo: $a'^\mu = \Lambda^\mu_\nu a^\nu$

Invarianz: $a \cdot b' = \partial_{\mu\nu} a'^\mu b'^\nu = \partial_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta a^\alpha b^\beta$
 $\quad \quad \quad = g_{\sigma\tau} a^\sigma b^\tau = a \cdot b$

$\Rightarrow \partial_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\sigma \Lambda^\nu_\tau = g_{\sigma\tau}$

bzw. $\Lambda^T g \Lambda = g$

$(\det \Lambda)^2 = 1 \Rightarrow \det \Lambda = \pm 1$

und (oo-komp.) $\partial_{\mu\nu} \Lambda^\mu_0 \Lambda^\nu_0 = (\Lambda^0_0)^2 - \sum_{i=1}^3 (\Lambda^i_0)^2 = 1$
 $\Rightarrow (\Lambda^0_0)^2 \geq 1 \Rightarrow \Lambda^0_0 \geq 1$ oder $\Lambda^0_0 \leq -1$

haben also vier "Klassen" von Lorentztransformationen (LT)

"eigentliche" LT := $\{ \det \Lambda = +1, \Lambda^0_0 \geq 1 \} =: \Lambda_E$

(die anderen drei: $\Lambda_P, \Lambda_T, \Lambda_R, \Lambda_C$)

mit Zeitumkehr $\Lambda_T := \text{diag}(-1, 1, 1, 1) : x^0 \rightarrow -x^0, \vec{x} \rightarrow \vec{x}$

und Raumspiegelung $\Lambda_P := \text{diag}(1, -1, -1, -1) : x^0 \rightarrow x^0, \vec{x} \rightarrow -\vec{x}$

boost: boost z.B. in x-Richtung



Uhren system $t=t'=0$ bei $x=x'=0$

Ereignis (t, x, y, z) in gestrichelten Koordinaten?

$t' = \gamma(t - vx)$, $x' = \gamma(x - vt)$, $y' = y$, $z' = z$


bzw. $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, $(\Lambda^\mu_\nu)_{\text{boost}} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

eine bequemere Parameterisierung (γ, v nicht unabhängig):

setze $v := \tanh \theta \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \cosh \theta$

so daß $(\Lambda^\mu_\nu)_{\text{boost}} = \begin{pmatrix} \cosh \theta & -\sinh \theta & 0 & 0 \\ -\sinh \theta & \cosh \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ mit $\cosh \theta = \gamma$
 $\sinh \theta = \gamma v$

in Analogie zu den Rotationen z.B. um z-Achse [vgl. EDP II]



$t' = t$, $x' = x \cos \varphi + y \sin \varphi$, $y' = -x \sin \varphi + y \cos \varphi$, $z' = z$
 bzw. $(\Lambda^\mu_\nu)_{\text{rot.}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ mit $C = \cos \varphi$
 $S = \sin \varphi$

weitere Vorgehen:

a_μ heißt "kovariant", $a_\nu = g_{\mu\nu} a^\mu$ "kontravariant"

ein "Vektor" transformiert unter LT: $a'^\mu = \Lambda^\mu_\nu a^\nu$

ein "Tensor" auch: $a'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma a^{\rho\sigma} = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \dots a^{\rho\sigma\tau} \dots$

(Skalar: Tensor nullter Stufe)

Vektor: erster

Tensor: zweiter

(Physik muß sich als (Komp. eines) Tensor(s) beschreiben lassen!!!)

z.B. $\varepsilon_{\mu\nu\sigma} := \begin{cases} +1 & \text{für gerade Permutation von } 0123 \\ -1 & \text{für ungerade} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

ist invariant unter eigentlichen LT's

Relevanz: oft sinnvoll aus "Schwerpunkt-System" (CMS) zu transformieren, $\sum \vec{p}_i = \vec{0}$ center-of-mass-system

klassische Rechnung: $E = T + V = \frac{p^2}{2m} + V(x)$ hier 1D, da Einpartikel System
 Hamilton-Operatoren $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x)$ Zustandsoperator
 Schrödinger-Gly $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ diff. Zeitentwicklung
 Vertauschungsrelation $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ Kommutator-Relation ("=1 für $i=j$, 0 sonst")
 Energie-Eigenzustände $\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$
 $\Rightarrow |n(t)\rangle = e^{-iE_n t / \hbar} |n(0)\rangle$

Übergang zu Ortsdarst. $\psi(x,t) = \langle x | \psi(t) \rangle$ (positiv + orthogonaler)
 $\hat{x}_i \rightarrow x_i$ und $\hat{p}_i \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_i}$
 $\rightarrow$ Schrödinger-Gly: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) \right) \psi(x,t)$

konkretes Beispiel: harmonischer Oszillator

$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2$
 algebraische Gly: $\hat{H}$ als Abschlusprodukt eines Operators darstellbar
 $\rightarrow$ Ladderoperatoren $\hat{a}^\dagger$ (Kreuzungs-Op.) $= \frac{m\omega\hat{x} + i\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar}}$
 $\hat{a}$ (Erzeugnis-Op.) $= \frac{m\omega\hat{x} - i\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar}}$

$\Rightarrow [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$
 $\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2} (\hat{a}^\dagger + \hat{a})^2 = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \hat{N} + \frac{\hbar\omega}{2}$ besetzungszahl-Op.
 mit Eigenzuständen $|n\rangle$ von $\hat{N}$
 $\Rightarrow \hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$
 $\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$

oft kann man ein System aber nicht vollständig lösen!
 $\rightarrow$ wichtiges Werkzeug für Näherungs-Lösungen: Störungstheorie

z.B. $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ wobei $\hat{V} \ll \hat{H}_0$

Energie-Eigenwerte? Reihe!

$$E_n = E_n^{(0)} + \hat{V} E_n^{(1)} + \hat{V}^2 E_n^{(2)} + \dots$$

$$|n\rangle = |n\rangle^{(0)} + \hat{V} |n\rangle^{(1)} + \dots$$

$$\rightarrow \hat{H}_0 |n\rangle^{(0)} = E_n^{(0)} |n\rangle^{(0)}$$

$$E_n^{(1)} = \langle n | \hat{V} | n \rangle^{(0)}$$

es werden oft verschiedene Darstellungen der Zeitabhängigkeit benutzt:

• Schrödinger-Darstellung

Zustände sind zeitabhängig, Operatoren zeitunabhängig
 z.B. $\hat{x}, \hat{p}, \hat{L}, \dots$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle_S = \hat{H} |\psi\rangle_S$$

$$\text{formale Gly: } |\psi(t)\rangle_S = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle_S$$

$$\text{Abkürzungen: } \langle \hat{A}_S \rangle = \langle \psi(t) | \hat{A}_S | \psi(t) \rangle_S$$

• Heisenberg-Darstellung

Operatoren folgen einer Bewegungsgly, Zustände zeitunabhängig
 (sind also zeitunabhängig)

$$\text{def. } \hat{A}_H(t) := e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A}_S e^{-i\hat{H}t/\hbar} ; |\psi\rangle_H = e^{i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle_S$$

$$\rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{A}_H(t) = [\hat{A}_H(t), \hat{H}]$$

$$\langle \hat{A}_H(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{A}_H(t) | \psi(0) \rangle_S$$

- Umschreibungs- Darstellung (oder Dirac-Darb.)
(liegt Zusammenhang zwischen Schröd.- + Heisenb.- Darst.)

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$$

$$|q(t)\rangle_I := e^{i\hat{H}_0 t} |q(t)\rangle_S$$

$$\hat{A}_I(t) := e^{i\hat{H}_0 t} \hat{A}_S e^{-i\hat{H}_0 t}$$

$$\hat{V}_I(t) := e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t}$$

$$\text{so daß } i\partial_t |q(t)\rangle_I = e^{i\hat{H}_0 t} [-\hat{H}_0 + \hat{H}] |q(t)\rangle_S$$

$$= \hat{V}_I(t) |q(t)\rangle_I$$

$$\text{und } i\partial_t \hat{A}_I(t) = [\hat{A}_I(t), \hat{H}_0]$$

mit Zeitentwicklungsgenerator $\hat{U}_I(t, t_0)$

$$|q(t)\rangle_I := \hat{U}_I(t, t_0) |q(t_0)\rangle_I$$

$$\text{folgt dann } i\partial_t \hat{U}_I(t, t_0) = \hat{V}_I(t) \hat{U}_I(t, t_0)$$

und initiale $\hat{U}_I(t, t_0) = \mathbb{1}$ als "Anfangsbedingung"

2. Beschreibung freier Teilchen. Rel. QM

relativistische Teilchen $\Rightarrow$ QFT.

Zunächst jedoch freie Teilchen $\Rightarrow$ relativistische "klassische" QM ab.

2.1. Grundgleichungen

Klein-Gordon-Gly. (Spin 0)

Erinnerung: nichtrel. Beziehung $E = \frac{p^2}{2m}$

setze $E \rightarrow i\partial_t$ und $\vec{p} \rightarrow -i\vec{\nabla}$

$\Rightarrow$ Schrödinger-Gly. für freie Teilchen mit Masse m

relativistische Verallgemeinerung?

Physik muß Lorentzinvariant sein!

$$p_\mu p^\mu = m^2 \Leftrightarrow E^2 - \vec{p}^2 - m^2 = 0 \Leftrightarrow [-\partial_t^2 + \vec{\nabla}^2 - m^2] \psi = 0$$

also $\boxed{[\partial_\mu \partial^\mu + m^2] \psi = 0}$ "Klein-Gordon-Gly."

Rechnung: beschreibt Eigenschaften freier Spin 0 Teilchen (z.B. $\pi, \dots$)

Lösungen: später...

Dirac-Gly. (Spin 1/2) 1927

Idee: Dgl 2. Ordnung $\Rightarrow$ (Dgl 1. Ordnung)²

geht sofort für $\vec{p} = \vec{0}$:

$$0 = p_\mu p^\mu - m^2 = (p^0)^2 - m^2 = (p^0 - m)(p^0 + m)$$

$$\Rightarrow (p^0 - m) = 0 \text{ oder } (p^0 + m) = 0 : 1. \text{ Ordnung in } p^0$$

Ansatz für allgemeines $\vec{p} \neq \vec{0}$

$$p_\mu p^\mu - m^2 =: (\beta^0 p_0 - m)(\gamma^0 p_0 + m)$$

mit 8 zu bestimmenden Koeffizienten: β^0, γ^0

keine Term $\sim p$ auf rhs $\Rightarrow \beta^i = \gamma^i$

quadr. Term: $\gamma^{\mu\nu} p_\mu p_\nu =: \gamma^{\mu\nu} p_\mu p_\nu$ (4)

auf beiden Seiten der Gg (*) steht eine Summe von Termen die quadratisch in γ -Komponenten sind:

Koeff.-Vergleich $\rho_0, \rho_1, \dots : 1 = \gamma^0 \gamma^0, -1 = \gamma^1 \gamma^1 = \gamma^2 \gamma^2 = \gamma^3 \gamma^3$

Koeff.-Vergleich $\rho_{\mu\nu}, \rho^{\mu\nu} : 0 = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu$ für $\mu \neq \nu$

Lösungsversuch: $\gamma^0 = \pm 1, \gamma^k = \pm i \quad (k=1,2,3)$

→ erfüllt die ersten vier Bed. ✓
aber nicht alle letzte ✗

(Idea (Dirac!)): γ könnten Matrizen sein

Def. Antikommutator $\{A, B\} := AB + BA$

dann ist Gg. (*) $\Leftrightarrow \boxed{2\gamma^{\mu\nu} = \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}}$

Lösungsversuch: γ könnten 2×2 -Matrizen sein

z.B. Pauli-Matrizen $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

diese erfüllen $2\delta_{kl} = \{\sigma_k, \sigma_l\}$

aber die letzte unabh. 2×2 -Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ erfüllt $\{A, \sigma_k\} = 2\sigma_k$ ✗

Lösungsversuch: γ könnten 3×3 -Matrizen sein

wegen $\gamma^\mu \gamma^\nu = -\gamma^\nu \gamma^\mu \quad (\mu \neq \nu)$ oder N bei $N \times N$ -Matrizen ist $\text{Det}(\gamma^\mu) \text{Det}(\gamma^\nu) = (-1)^3 \text{Det}(\gamma^\nu) \text{Det}(\gamma^\mu)$

wir fordern $\text{Det}(\gamma^\mu) \neq 0 \Rightarrow N \times N$ -Matrizen mit ungeradem N ✗

Lösungsversuch: γ als 4×4 -Matrizen

$\gamma^0 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \gamma^k := \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix}$ ✓ (Standard-Darstellung)

(alles 2×2 Blöcke: $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, 1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ etc.))

also: $0 = \rho_\mu \rho^\mu - m^2 = (\gamma^0 \gamma^0 - m)(\gamma^i \gamma^i + m)$

Faktorisierung gelungen ✓

nehme z.B. $0 = \gamma^0 \gamma^0 - m$ ($+m$ ist äquivalent, s. später...)

jetzt wieder $\rho^0 = E \rightarrow i\partial_t$ und $\rho^i = p^i \rightarrow i\partial_i \quad (\Leftrightarrow p_\mu \rightarrow i\partial_\mu)$

so daß $\boxed{(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0}$ "Dirac-Gl."

Bemerkung: 4 Gl'n: ψ = Dirac-Spinor = 4-komponentiger Spaltenvektor und $m := m_{\psi\psi}$

Elektron: beschreibt Eigenschaften freier $\bar{\psi} = \frac{1}{2}$ Teilchen (z.B. $e^-, \mu^-, \dots$)

Spin $\frac{1}{2}$ hat 2 Freiheitsgrade

Dirac-Spinor ψ hat 4 Freiheitsgrade = Teilchen + Antiteilchen (!)
Lösungsm: später...

Maxwell-Gl'n (Spin 1)

(Erhalten: $\mu_0 = \epsilon_0 = 1$, und natürlich $c=1$)

(1) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho \quad (2) \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

(3) $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}} \quad (4) \vec{\nabla} \times \vec{B} = \dot{\vec{E}} + \vec{j}$

Können wir dies auch Lagrange-Formant aufschreiben?

def. Vierer-Strom $\bar{j}^\mu := (\rho, \vec{j})$

Vier-Potential $A^\mu := (\phi, \vec{A})$

$\Rightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \dot{\vec{A}}$

erfüllen (2), (3) identisch ✗

Feldstärketensor

$F^{\mu\nu} := \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$

→ $\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$ Maxwell-Gl.

z.B. $v=0: \partial_0 F^{00} + \partial_i F^{i0} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = j^0 = \rho \stackrel{!}{=} \rho_{\text{ex}}(t)$ w

NB: das Vektorpotential A^μ ist nicht eindeutig bestimmt:

jedes $A'^\mu = A^\mu + \partial^\mu \chi$ (mit beliebigem $\chi(x)$)
ist auch eine Lösung, d.h. gilt dasselbe $F^{\mu\nu}$:

$$F'^{\mu\nu} = \partial^\mu A'^\nu - \partial^\nu A'^\mu = F^{\mu\nu} + (\partial^\mu \partial^\nu - \partial^\nu \partial^\mu) \chi = F^{\mu\nu}$$

⇒ "Eichfreiheit"

die freien Maxwell-Gl. $\partial_\mu \partial^\mu = \partial_\mu^2 - \partial_\nu^2 = "$ d'Alembert-Operator "

$$0 = \partial_\nu F^{\mu\nu} = \partial_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\nu \partial^\nu A^\mu = (\Box \delta^\mu_\nu - \partial^\mu \partial_\nu) A^\nu$$

sind also im Wesentlichen zur KG-Gl. äquivalent.

2.2 Lösungen der Grundgleichungen

Klein-Gordon $(KG) - \text{Gly}_m$ (S. 5.12)

$$0 = (\partial_\mu \partial^\mu + m^2) \phi = (\partial_t^2 - \vec{\nabla}^2 + m^2) \phi$$

$\phi(x) = \phi(t, \vec{x}) = ?$ kann i.A. reell oder komplex sein

Ansatz (einfache Wellen) $\phi(x) = C \cdot e^{-i k x} = C \cdot e^{-i k^\mu x_\mu} = C \cdot e^{-i \omega t + i \vec{k} \cdot \vec{x}}$
einsetzen $\Rightarrow ((-i k_\mu)(-i k^\mu) + m^2) C e^{-i k x} = 0$
 $\Rightarrow k^0 = \pm \sqrt{\vec{k}^2 + m^2} =: \pm E_{\vec{k}}$

allg. Lsg ist LK eine Wellen, mit bel. Koeff. C

$$\phi(x) = \int d^3 \vec{k} \left(C_+(\vec{k}) e^{-i E_{\vec{k}} t + i \vec{k} \cdot \vec{x}} + C_-(\vec{k}) e^{+i E_{\vec{k}} t + i \vec{k} \cdot \vec{x}} \right)$$

$$= \int d^3 \vec{k} \left(C_+(\vec{k}) e^{-i E_{\vec{k}} t + i \vec{k} \cdot \vec{x}} + C_-(\vec{k}) e^{i E_{\vec{k}} t - i \vec{k} \cdot \vec{x}} \right)$$

$$= \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3 2 E_{\vec{k}}} \left(a_{\vec{k}} e^{-i p x} + b_{\vec{k}}^* e^{i p x} \right)$$

im 2. Schritt: $\vec{k} \rightarrow -\vec{k}$ am zweiten Term

im 3. Schritt: $\vec{k} \rightarrow \vec{k}$, $E_{\vec{k}} \rightarrow E_{\vec{k}} = |\vec{k}|$

$\Rightarrow p \cdot p = m^2$, $p \cdot x = E_{\vec{k}} t - \vec{k} \cdot \vec{x}$

$$C_+(\vec{k}) \rightarrow \frac{a_{\vec{k}}}{\sqrt{(2\pi)^3 2 E_{\vec{k}}}}, \quad C_-(\vec{k}) \rightarrow \frac{b_{\vec{k}}^*}{\sqrt{(2\pi)^3 2 E_{\vec{k}}}}$$

wieviel Freiheitsgrade hat diese Lsg?

$a_{\vec{k}}, b_{\vec{k}}$ unabhängig voneinander $\Rightarrow \phi \in \mathbb{C} \Rightarrow 2$ Freiheitsgrade (z.B. $\pi^\pm$)
 $a_{\vec{k}} = b_{\vec{k}} \Rightarrow \phi \in \mathbb{R} \Rightarrow 1$ Freiheitsgrad (z.B. π^0)

Teilcheninterpretation? am Teilchen (Passe m, Impuls $\vec{p}$)?

$a_{\vec{p}} \sim \delta(\vec{p} - \vec{p})$, $\phi(x) \sim e^{-i E_{\vec{p}} t + i \vec{p} \cdot \vec{x}}$

$b_{\vec{p}} \sim \delta(\vec{p} - \vec{p})$, $\phi(x) \sim e^{+i E_{\vec{p}} t - i \vec{p} \cdot \vec{x}}$

→ KG-Gly impliziert immer auch neg. E. - Lsg!
→ Unstetigkeitsproblem?

• bilde $(i \partial_t^2 - \Delta) \phi - (i \partial_t^2) \phi^*$

$$0 = (i \partial_t^2) (\partial_t^2 - \vec{\nabla}^2 + m^2) \phi - (i \partial_t^2) (\partial_t^2 - \vec{\nabla}^2 + m^2) \phi^*$$

$$= \partial_t [i (\phi^* \dot{\phi} - \dot{\phi}^* \phi)] + \vec{\nabla} \cdot [-i (\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^*)]$$

$$=: \partial_t S + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \quad (\text{Conti: } \partial_\mu j^\mu = 0)$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Li-Standardtheorie} \\ \text{Unstetigkeitsdichte} \end{array} \right.$

$S \sim \pm 2 E_{\vec{k}}$! negative Wsk. $\Rightarrow$ Exo, SLO

historisch: Vermutung; Problem: Teilcheninterpretation.

→ Feynman-Stückelberg-Interpretation [s. z.B. Haken/Martin §3.5]

Grundidee $e^{+i E t} = e^{-i E(-t)}$

Teilchen mit $E > 0$, propagiert rückwärts in Zeit

= Antiteilchen, das vorwärts propagiert

→ $\vec{k}$: Teilchen $\xrightarrow{+}$ Antiteilchen $\xleftarrow{-}$

Zweite Quantisierung

Klein von der Wellen verschiedene Interpretationen

Feld $\phi(x) \rightarrow$ Operator $\hat{\phi}(x)$ (= Quanten Feld Theorie)

$$QM: [\hat{x}, \hat{p}] = i \rightarrow QFT: [\hat{\phi}(t, \vec{x}), \partial_0 \hat{\phi}^\dagger(t, \vec{y})] = i \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})$$

diese Vertauschungsrelation wird erfüllt durch

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3 2E_p} \left(\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ipx} + \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger e^{ipx} \right)$$

$$(\Rightarrow \hat{\phi}^\dagger = \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{+ipx} + \hat{b}_{\vec{p}} e^{-ipx})$$

$$\text{mit } [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger] = \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) = [\hat{b}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{q}}^\dagger] \quad \left. \begin{array}{l} \text{vgl.} \\ \text{harm. Osz.} \\ \text{S. 9} \end{array} \right\}$$

$$0 = [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}] = [\hat{b}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{q}}] = [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{q}}] = \dots$$

(Beweis: s. Übung, Aufgabe 11)

$\rightarrow$ QFT-Leg folgt aus klass. Leg durch

$$q_{\vec{p}}, q_{\vec{q}}, b_{\vec{p}}, b_{\vec{q}} \rightarrow \hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger, \hat{b}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{q}}^\dagger \quad (\text{Vernichter + Erzeuger})$$

Interpretation:

$$\hat{Q} := i \int d^3 \vec{x} (\hat{\phi}^\dagger \partial_0 \hat{\phi} - \partial_0 \hat{\phi}^\dagger \hat{\phi}) \quad \text{ist erhalten}$$

$$\dots [\phi \text{ erweisen, } \int d^3 \vec{x} e^{ipx} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p}), [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{q}}] = 0 \text{ (unten)}] \quad (\text{vgl. S. 16; Übung, Aufgabe 12})$$

$$= \int d^3 \vec{p} \left(\frac{1}{2} (\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} + \hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger) - \frac{1}{2} (\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger \hat{b}_{\vec{p}} + \hat{b}_{\vec{p}} \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger) \right)$$

$$= [\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}}] + a a = \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger \hat{b}_{\vec{p}} + b b$$

$$= \int d^3 \vec{p} (\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} - \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger \hat{b}_{\vec{p}})$$

ist Differenz von
Besetzungs-Zahl-Op's!

$$\sim \text{Anzahl}(\pi^+) - \text{Anzahl}(\pi^-)$$

$\sim$ Ladung (und nicht Wahrscheinlichkeit $\rightarrow$ darf neg. sein!)

Serie

$$\hat{H} = \int d^3 \vec{x} \left((\partial_0 \hat{\phi}) \partial_0 \hat{\phi}^\dagger + (\vec{\nabla} \hat{\phi})^\dagger \cdot \vec{\nabla} \hat{\phi} + m^2 \hat{\phi}^\dagger \hat{\phi} \right)$$

$$= \dots [\phi \text{ erweisen, } \int d^3 \vec{x} e^{ipx} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p}), [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{b}_{\vec{q}}] = 0 \text{ (unten)}]$$

$$= \int d^3 \vec{p} E_p \left(\frac{1}{2} (\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} + \hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger) + \frac{1}{2} (\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger \hat{b}_{\vec{p}} + \hat{b}_{\vec{p}} \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger) \right)$$

$$= \int d^3 \vec{p} E_p \left(\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} + \hat{b}_{\vec{p}}^\dagger \hat{b}_{\vec{p}} + \delta^{(3)}(\vec{0}) \right) \quad \text{ist Summe von}$$

positiv! $\rightarrow$ "Vakuumenergie"

Besetzungs-Op's!

$\sim$ Gesamtenergie

(falls Volumen des Systems endlich)
 $((2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{0}) = \int d^3 \vec{x} e^{i0x} = \int d^3 \vec{x} = V)$

haben also keine neg. Energien mehr.

$\hat{a}_{\vec{p}}$ vernichtet ein Teilchen mit Impuls $\vec{p}$;

dieses muß also im Anfangszustand vorhanden sein.

$\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ erzeugt ein Teilchen mit Impuls $\vec{p}$;

dieses muß also im Endzustand vorhanden sein.

$\Rightarrow \hat{a}_{\vec{p}}$ repräsentiert ein einlaufendes Teilchen
 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ auslaufendes Teilchen
 $\hat{b}_{\vec{p}}$ einlaufendes Antiteilchen
 $\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger$ auslaufendes Antiteilchen

	T.	A.
ein	$\hat{a}_{\vec{p}}$	$\hat{b}_{\vec{p}}^\dagger$
aus	$\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$	$\hat{b}_{\vec{p}}$

Naumann-Gly- (S. 5.15)

strukturell: $\Pi_{\text{Max}} \approx$ KG; benutze Leg der KG mit kleinen Störungen

wegen "Eichfreiheit" dürfen wir von den Lsg

(2.8.) fordern: $\partial_i A^i(t, \vec{x}) = 0$ "Coulomb-Eichung"

$$\Rightarrow (\Pi_{\text{Max}})^{V=0}: \partial_i \partial^i A^0 = j^0$$

$$(\text{Greens z. A}) \Rightarrow A^0(t, \vec{x}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3 \vec{x}' \frac{j(t, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

$\rightarrow A^0 \sim j$ in Coulomb-Eichg. keine Uellen.

$$\Rightarrow (\Pi_{xx})^{\nu\epsilon i} : \partial_\nu \partial^\mu A^\epsilon - \partial_0 \partial^\epsilon A^\mu = \delta^{\epsilon i}$$

$$\Leftrightarrow \partial_\nu \partial^\mu A^\epsilon = \delta^{\epsilon i} + \partial_0 \partial^\epsilon A^\mu \quad ; \quad 3 \text{ (inhom.) Wellengl.}$$

also können wir für die freien Phon. ($g=0, \vec{r}=\vec{0}$)

$$A^0=0, \quad \partial_\mu \partial^\mu A^i=0, \quad \partial_i A^i=0 \quad (\text{Coulomb-Beding.})$$

Lösungen als ebene Wellen finden

Wie üb. Hier aber:

- $A^\mu(t, \vec{x})$ reell $\Leftrightarrow \hat{A}^\mu(t, \vec{x})$ hermitisch $\Leftrightarrow \hat{a}_\vec{r} = \hat{a}_\vec{r}^\dagger$
- i.A. gibt es vier verschiedene $\text{Lsg } A^\mu$, $\mu=0,1,2,3$

$\Rightarrow$ Polarisationsvektoren $\epsilon_{(i)}^\mu(\vec{r})$

$$\hat{A}^\mu(t, \vec{x}) = \int \frac{d^3\vec{r}}{(2\pi)^3 2\epsilon_r} \sum_\lambda \epsilon_{(i)}^\mu(\vec{r}) \left(\hat{a}_{\vec{r}}^{(\lambda)} e^{-ipx} + \hat{a}_{-\vec{r}}^{(\lambda)\dagger} e^{ipx} \right)$$

$$\Rightarrow \epsilon_{(i)}^0(\vec{r}) = 0 \quad (\text{damit } A^0=0)$$

$$p_i \epsilon_{(i)}^i(\vec{r}) = 0 \quad (\text{damit } \partial_i A^i = \dots p_i \epsilon_{(i)}^i = 0)$$

$\uparrow$ d.h. $\vec{\epsilon} \perp \vec{p}$: Pol.-vekt. $\perp$ Ausbreitungsrichtung

$\Rightarrow \exists$ zwei lin. unabh. Lsg

$$\text{z.B. } \vec{p} = |\vec{p}| \vec{e}_2 \Rightarrow \vec{\epsilon}_{(1)} = (1, 0, 0)$$

$$\vec{\epsilon}_{(2)} = (0, 1, 0) \quad (\text{oder } \vec{\epsilon}_{(1')})$$

$\Rightarrow$ freies Photon ist transversal polarisiert

für die Summe über alle Polarisationsvektoren gilt die

$$\text{"Vollständigkeitsrelation"} \quad \sum_{\lambda=1,2} \epsilon_{(i)}^\mu(\vec{r}) \epsilon_{(i)}^\nu(\vec{r}) = \delta^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{p^2}$$

(in Coulomb-Eichung)

Bem. : $A^\mu \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{Lsg hat keinen } \hat{b}\text{-Op.} \Rightarrow \nexists \text{ Antiphotonen}$

• $\hat{a}_{\vec{p}}^{(\lambda)} / \hat{a}_{-\vec{p}}^{(\lambda)\dagger}$ repräsentiert ein einlaufendes/auslaufendes Teilchen

• Polarisation bestimmt durch $\epsilon_{(i)}^\mu(\vec{r})$, $\lambda=1,2$

Dire-Glg.

Sacke Lsg der Dirac-Glg $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) = 0$, $\psi(x) = \psi(t, \vec{x}) = ? \in \mathbb{C}$

wieder als ebene Wellen $\psi(x) \sim u(\vec{p}) e^{-ipx}$

d.h. $i\partial_\mu \rightarrow p_\mu$ $\hookrightarrow$ analog Pol.-Wellen $\vec{\epsilon}(\vec{p})$ in $\Pi_{xx}\text{-Lsg}$

$$\Rightarrow (\gamma^\mu p_\mu - m) u(\vec{p}) = 0$$

$$\text{Lsg. } \boxed{(\not{p} - m) u(\vec{p}) = 0} \quad \text{mit } \not{p} := \gamma^\mu p_\mu$$

Lsg. (mit Standard-Basis der γ^μ , z.B. (3))

$$\begin{pmatrix} (\not{p} - m) u_1 \\ (\not{p} - m) u_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} (p^0 - m) u_1 - p^3 u_2 = 0 \\ p^1 u_1 - (p^2 + m) u_2 = 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{p^0 - m} p^3 u_2 = \frac{1}{(p^0)^2 - m^2} p^3 \sigma^3 p^0 u_1$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{p^3}{(p^0)^2 - m^2} \Leftrightarrow p^0 = \pm \sqrt{p^2 + m^2} = \pm E_{\vec{p}}$$

$= p^0 \delta \left\{ \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} \right\} \sigma^3 \delta \left\{ \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} \right\} = p^3 \delta \left\{ \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} \right\} \frac{1}{2} 2\delta^3 \delta_{\vec{p}, \vec{p}} = p^3 \cdot 1$

es gilt (wie bei Lsg) wieder 2 Arten von Lsg : "pos/neg. Energie"

$\text{Lsg "pos. Energie"} : u(\vec{p}) e^{-ipx}$, erfüllt $(\not{p} - m) u(\vec{p}) = 0$

$\Rightarrow$ setze $u(\vec{p}) = (p^0 + m) \cdot c_1 \cdot u_0$ $\leftarrow$ Spinnor, unabhängig von $\vec{p}$

$\leftarrow$ Konstante $c_1 \in \mathbb{R}$ (s.u. aus Norm.)

$$(\text{dann dann } (\not{p} - m)(p^0 + m) c_1 u_0 = (p^2 - m^2) c_1 u_0 = 0)$$

Zwei unabh. (Spin-) Zustände; wähle $u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{s}_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{s}_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

also insgesamt $u(\vec{p}, s) = c_1 (p^0 + m) \begin{pmatrix} \vec{s}_s \\ 0 \end{pmatrix}$, $s = \pm$

$\text{Lsg "neg. Energie"} : v(\vec{p}) e^{+ipx}$ mit $p^0 = +E_{\vec{p}}$, erfüllt $(\not{p} + m) v(\vec{p}) = 0$

$\Rightarrow$ setze $v(\vec{p}) = (p^0 - m) \cdot c_2 \cdot v_0$

$$\text{wähle } v_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{so defn } v(\vec{p}, s) = c_2 (p^0 - m) \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{s}_s \end{pmatrix}$$

die $\text{Lsg } u, v$ sind orthogonal gemäß: $u^\dagger v = 0 = v^\dagger u$

Im Relativsystem ($\vec{p} = \vec{0}$; $p^0 = m$) ergibt sich damit

$$u(\vec{0}, s) = c_1 \begin{pmatrix} 2m & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix} = 2m c_1 \begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v(\vec{0}, s) = c_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \chi_s \end{pmatrix} = -2m c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ \chi_s \end{pmatrix}$$

def. hermitescher konjugierter Spinor $u^\dagger := (u_1^*, u_2^*, u_3^*, u_4^*)$ falls $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$

def. Dirac-adjungierter Spinor $\bar{u} := u^\dagger \gamma^0$

Normierung der u 's? $\rightarrow$ Wert der Konstanten c_1, c_2

fordere $\bar{u}(\vec{p}, s) u(\vec{p}, s) = 2m \delta_{ss'}$

$\bar{v}(\vec{p}, s) v(\vec{p}, s) = -2m \delta_{ss'}$

$(\bar{u} v = 0 = \bar{v} u)$ automatisch durch Wahl der u, v

$\Rightarrow c_1 = -c_2 = \frac{1}{\sqrt{E_p + m}}$

$\Rightarrow u^\dagger(\vec{p}, s) u(\vec{p}, s') = 2E_p \delta_{ss'}$ $= v^\dagger(\vec{p}, s) v(\vec{p}, s')$

oft (s.z.B. Später: Auswertung von "Feynman-Diagrammen" brauchen wir die Summe über alle Spinzustände: Vollständigkeitsrelation

$$\begin{aligned} \sum_{s,s'} u(\vec{p}, s) \bar{u}(\vec{p}, s') &= \sum_{s,s'} c_1^2 \underbrace{\begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{s'}^\dagger & 0 \end{pmatrix}}_{\substack{\text{letzte Term:} \\ \begin{pmatrix} p_\mu \gamma^\mu + m \end{pmatrix} \gamma^0 \\ = \begin{pmatrix} p_\mu \gamma^\mu + m \end{pmatrix} \gamma^0 \\ = \gamma^0 \begin{pmatrix} p^0 & \vec{p} \end{pmatrix} \\ = \gamma^0 \begin{pmatrix} E_p & \vec{p} \end{pmatrix} \end{pmatrix}}_{\substack{\text{Beweis} \\ \text{s. Übung 14}}} \begin{pmatrix} \chi_{s'}^\dagger & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_\mu \gamma^\mu + m \end{pmatrix} \gamma^0 \begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{p^0 + m} \begin{pmatrix} p^0 + m & -\vec{p} \cdot \vec{\sigma} \\ \vec{p} \cdot \vec{\sigma} & -p^0 - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{s'}^\dagger & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{p^0 + m} \begin{pmatrix} (p^0 + m)^2 & -(p^0 + m) \vec{p} \cdot \vec{\sigma} \\ (p^0 + m) \vec{p} \cdot \vec{\sigma} & -p^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{s'}^\dagger & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} p^0 + m & -\vec{p} \cdot \vec{\sigma} \\ \vec{p} \cdot \vec{\sigma} & -p^0 - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{s'}^\dagger & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_s \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= (p^0 + m) \chi_{s'}^\dagger \chi_s \end{aligned}$$

$\sum_{s,s'} v(\vec{p}, s) \bar{v}(\vec{p}, s') = \dots = (p^0 - m) \chi_{s'}^\dagger \chi_s$

zweite Quantisierung

die Lm der Dirac-Gly werden durch Teilchen- und Antiteilchenzustände interpretiert. [$\rightarrow$ s. QFT-Vorbereitung]

Hin: die wichtigsten Resultate der QFT-Behandlung als "Zitat"

Feldern $\psi(x) \rightarrow$ Feldoperatoren

$$\hat{\psi} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \sum_{s=\pm} \left(a_{\vec{p}}^{(s)} u(\vec{p}, s) e^{-ipx} + b_{\vec{p}}^{+(s)} v(\vec{p}, s) e^{+ipx} \right)$$

$$\hat{\bar{\psi}} = a_{\vec{p}}^\dagger \bar{u} e^{+ipx} + b_{\vec{p}}^\dagger \bar{v} e^{-ipx}$$

Vertauschungsrelationen sind Antikommutatoren

$\{a_{\vec{p}}^{(s)}, a_{\vec{p}'}^{+(s')}\} = \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}') \delta_{ss'} = \{b_{\vec{p}}^{(s)}, b_{\vec{p}'}^{+(s')}\}$; Rest = 0

$\Rightarrow$ Dirac-Felder gehorchen der Fermi-Dirac-Statistik

z.B. 1-Elektron-Zustand $|e\rangle \sim a_{\vec{p}}^{(s)} |0\rangle$

2- $|2e\rangle \sim a_{\vec{p}}^{(s)} a_{\vec{p}}^{+(s')} |0\rangle = 0$ Pauli-Prinzip

Ges.-Energie $\rightarrow$ Hamilton-Operator (wie bei KG-Gly, s.S. 18)

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \int d^3p E_p \sum_{s=\pm} \left(a_{\vec{p}}^{(s)} a_{\vec{p}}^{+(s)} - b_{\vec{p}}^{+(s)} b_{\vec{p}}^{(s)} \right) \\ &= \int d^3p E_p \sum_{s=\pm} \left(a_{\vec{p}}^{(s)} a_{\vec{p}}^{+(s)} + b_{\vec{p}}^{+(s)} b_{\vec{p}}^{(s)} - \delta^{(3)}(\vec{0}) \right) \end{aligned}$$

erwartete Gesamtenergie

$$\hat{Q} = \int d^3x \frac{1}{4} \psi \gamma^0 \psi = \int d^3p \sum_{s=\pm} \left(a_{\vec{p}}^{(s)} a_{\vec{p}}^{+(s)} - b_{\vec{p}}^{+(s)} b_{\vec{p}}^{(s)} \right)$$

völlig analog zur Lm der KG-Gly (s.S. 8) interpretiert man die Operatoren $\hat{a}, \hat{b}$ wieder als ein/aus-laufende Teilchen/Antiteilchen:

	Teilchen	Antiteilchen
einlaufendes	$a_{\vec{p}}^{(s)}$	$b_{\vec{p}}^{+(s)}$
auslaufendes	$a_{\vec{p}}^{+(s)}$	$b_{\vec{p}}^{(s)}$

Im Zusammenhang mit Dine-Teilchen ist es nützlich, zwei Konzepte zur Klassifizierung des "Eigenschaftsraums" einzuführen:

Helizität

Def (physikalisch; analog Polarisation des Photons)

Helizität $h = (\text{Projektion des Spins auf Bewegungsrichtung}) \cdot 2$

z.B.  $\vec{s} = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow h = \pm 1$

Beschreibung (mathematisch; s. auch Übung, Aufgabe 15)

Helizität $h(\vec{p}) := \vec{e}_p \cdot \vec{\Sigma}$, $\vec{\Sigma} := \begin{pmatrix} \vec{p} \cdot \vec{p} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{e}_p = \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$

Spin entlang Bewegungsrichtung $\vec{e}_p$ ist dann $S_{\vec{e}_p} = \frac{1}{2} h(\vec{p})$

es gilt: $h^2(\vec{p}) = 4 \Rightarrow EW = \pm 1$

Projektor $P_{\pm}^{(h)} := \frac{1 \pm h}{2}$ (denn $(P_{\pm}^{(h)})^2 = P_{\pm}^{(h)}$, $P_{+}^{(h)} P_{-}^{(h)} = 0$, $P_{+}^{(h)} + P_{-}^{(h)} = 1$)

$\rightarrow$ können jeden Zustand als $u = (P_{+}^{(h)} + P_{-}^{(h)})u =: u_{+}^{(h)} + u_{-}^{(h)}$ schreiben!

z.B. $\vec{p} = p\vec{e}_z \Rightarrow h(\vec{p}) = \text{diag}(1, -1, -1)$

$h(\vec{p}) u(\vec{p}, s) = h(\vec{p}) \frac{1}{\sqrt{E_p m}} \begin{pmatrix} \epsilon_{stm} & 0 & -p & 0 \\ 0 & \epsilon_{stm} & 0 & p \\ p & 0 & -\epsilon_{stm} & 0 \\ 0 & -p & 0 & -\epsilon_{stm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \xi_s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = h(\vec{p}) \begin{pmatrix} \sqrt{E_p m} \xi_s \\ \sqrt{E_p m} \xi_s \\ -s p \xi_s \\ \xi_s \end{pmatrix} = s u(\vec{p}, s)$

$\Rightarrow$ Helizitäts-EW ist s !

Chiralität

Def (mathematisch; s. auch Übung, Aufgabe 15)

Chiralitätsoperator $\gamma_5 := i \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

es gilt: $\gamma_5^2 = 1 \Rightarrow EW = \pm 1$

Projektor $P_{R,L} := \frac{1 \pm \gamma_5}{2}$ (denn $P_L^2 = P_L$, $P_R^2 = P_R$, $P_L P_R = 0$, $P_L + P_R = 1$)

$\rightarrow$ können jeden Zustand als $u = (P_L + P_R)u =: u_L + u_R$ schreiben!
 $\uparrow$ "rechts" / "links" handig

Beschreibung (physikalische Relevanz)

- die starke Wechselwirkung wirkt nur auf linkshändige Teilchen (s. später)
- masselose Teilchen: Chiralität $\hat{=}$ Helizität

z.B. $\vec{p} = p\vec{e}_z$, $m=0 \Rightarrow u(\vec{p}, s) = \sqrt{p} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \xi_s \end{pmatrix}$

$P_5 u(\vec{p}, s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \xi_s \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \xi_s \end{pmatrix} = s u(\vec{p}, s)$

$\Rightarrow$ Chiralitäts-EW ist s !

- Neutrinos werden nur im schwachen WW's erzeugt, sind also links-händig, $m_\nu = 0 \Rightarrow s = -1$:
 $\leftarrow \begin{matrix} s = -1 \\ \vec{s} = -\frac{1}{2} \end{matrix} \rightarrow \vec{p}$


3. wechselwirkende Teilchen

bisher: Beschreibung freier relativistischer Teilchen
 (mit Inputs $\vec{p}$; Momenten λ ; Helizität s)


Jetzt: Wechselwirkungen erlaubt

haben zwei grundlegende Arten von Prozessen:

Zerfälle



Streuung



3.1 Zerfälle

einige wichtige Volumen:

- Lebensdauer τ und meist für ein schlechtes Teilchen angegeben (vgl. Ü 4)
- $Q\Gamma \rightarrow$ für ein emittiertes T. keine genaue Lebensdauer $\rightarrow \tau$ ist "mittlere" Lebensdauer

• Zerfallsrate $\Gamma \hat{=}$ Wahrscheinlichkeit (pro Zeiteinheit) daß Zerfall stattfindet

T -Zahl N , $dN = -\Gamma N dt \Rightarrow N(t) = N(0) e^{-\Gamma t}$

es gilt $\Gamma = \frac{1}{\tau}$

(denn: $\tau = \langle t \rangle = \frac{\int_0^\infty t e^{-\Gamma t} dt}{\int_0^\infty e^{-\Gamma t} dt} = \frac{-\frac{1}{\Gamma} e^{-\Gamma t}}{\frac{1}{\Gamma} e^{-\Gamma t}} = \frac{1}{\Gamma}$)

• Zerfallszustand i (i beschreibt Art der Zerfallspartikel; s. PDG)

z.B. Zerfallende in einem Kanal $= \Gamma_i$

• Gesamtzerfallsrate $\Gamma_{\text{tot}} = \sum_i \Gamma_i$

• Verzweigungsverhältnis $\frac{\Gamma_i}{\Gamma_{\text{tot}}}$

Γ_i geben also das Verzweigungsverhältnis, d.h. wie oft Zerfälle in Kanal

Berechnung der Zerfallsrate

per zeitabhängige Störungsstheorie im Un-Bild (s.S.11 und 14)

$\hat{H} = \hat{H}_0 + g \hat{V}$; $|\psi(t)\rangle_Z = \frac{\hat{U}_Z(t, t_0)}{\langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle_Z} |\psi(t_0)\rangle_Z$
 freie T. Zeitentwicklungsgl. $= \mathbb{1} - ig \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') dt' + O(g^2)$

def Streumatrix $S_{fi} := \langle f | \hat{U}_Z(+\infty, -\infty) | i \rangle_Z$

$\hat{U}_{\text{Endzust. ("final")}}$ $\hat{U}_{\text{Anfangszustand ("initial")}}$

$\rightarrow$ für $g=0$ ist S_{fi} diagonal

$$S = \frac{\hat{V} = (\vec{E}_f, \vec{p}_f)}{E_f = \sqrt{\vec{p}_f^2 + m_f^2}} \frac{\hat{V} = (\vec{E}_i, \vec{p}_i)}{E_i = \sqrt{\vec{p}_i^2 + m_i^2}} \rightarrow \pi^+$$

hier Annahme: $g=0$ (eingetragenes π^0)

Wsk. hñe des Form $g \hat{V}_I(t') = \int d^3x \mathcal{M} \hat{\phi}^\dagger(t, \vec{x}) \hat{\phi}(t, \vec{x}) \vec{S}(t, \vec{x})$
 Konstante

mit $\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(\hat{a}_p e^{-ipx} + \hat{b}_p^\dagger e^{+ipx} \right)$ erzeugt Antiteilchen, $\hat{a}_p^\dagger$ erzeugt Teilchen.
 $\hat{\phi}^\dagger(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(\hat{a}_p^\dagger e^{+ipx} + \hat{b}_p e^{-ipx} \right)$ $\hat{a}_p^\dagger$ erzeugt Teilchen, $\hat{b}_p$ erzeugt Antiteilchen.
 $\vec{S}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(\hat{a}_p^\dagger e^{-ipx} + \hat{a}_p e^{+ipx} \right)$ vernichtet Teilchen, $\hat{a}_p$ erzeugt Teilchen.

dennit wird das mitt-teriale Naturerechnit
 (in erster Ordnung St.)

$$S_{fi} = -i \langle \pi^+(\vec{p}_1) \pi^-(\vec{p}_2) | \int_{-\infty}^{\infty} dt' d^3x \mathcal{M} \hat{\phi}^\dagger \hat{\phi} \vec{S} | S(\vec{q}) \rangle$$

$$= -i \int dt' d^3x \mathcal{M} \frac{1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{1}{(2\pi)^3 2E_2} \frac{1}{(2\pi)^3 2E_3} e^{i(p_1 t_0 - q t_0)} \times$$

$$= -i (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q) \frac{\mathcal{M}}{(2\pi)^3 2E_1 (2\pi)^3 2E_2 (2\pi)^3 2E_3}$$

$$= -i (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q) T_{fi} \leftarrow \text{Transfermatrix element}$$

$\uparrow$ E-p-Erhaltung; kommt automatisch heraus.

zur Berechnung der Zerfallsrate des S müssen wir über die

Impulse aller auslaufenden Teilchen integrieren: $((p_{\text{out}})_{\text{Zust.}} \sim \frac{1}{T}, (s.s. 25))$

$$\Gamma = \frac{1}{T} \int d^3p_1 d^3p_2 |S_{fi}|^2$$

$$= \frac{1}{T} \int d^3p_1 d^3p_2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q) \frac{(2\pi)^4 \delta^{(4)}(q)}{(2\pi)^3} |T_{fi}|^2$$

$$= V \cdot T, \text{ vgl. S.18}$$

das S im Anfangszustand ist ohne Teilchen, also überall im Raum.

Normierung $\langle S(q) | S(q) \rangle = \delta^{(3)}(0) = \frac{V}{(2\pi)^3}$

(denn: $\langle S(\vec{p}) | S(\vec{q}) \rangle = \langle 0 | \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle$
 $= \langle 0 | [\hat{a}_p^\dagger, \hat{a}_q^\dagger] + \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle = \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \langle 0 | 0 \rangle$)

also Teilchen nur für ein Teilchen mit Norm $\langle S(q) | S(q) \rangle = 1$ denn $\frac{V}{(2\pi)^3}$:

$$\Gamma_{S \rightarrow \pi^+ \pi^-} = \frac{1}{2E_3} \int \frac{d^3p_1}{(2\pi)^3 2E_1} \int \frac{d^3p_2}{(2\pi)^3 2E_2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q) |M|^2$$

"Fermi's Golden Regel"

$$\Gamma_{S \rightarrow 1 \dots n} = \frac{1}{2E_3} \int d^3x_n |M|^2$$

$$= \frac{1}{2E_3} \int \prod_{i=1}^n \frac{d^3p_i}{(2\pi)^3 2E_i} (2\pi)^4 \delta^{(4)}\left(\sum_{i=1}^n p_i - q\right)$$

"n-Teilchen Phasenraum Integration"

Staatstestender Teilchen, z.B. $c = \frac{1}{N!}$ für N identisch T.

Zur endgültigen Berechnung der Zersetzungsrate muß jetzt

"nur noch" die Phasenraumintegration ausgeführt werden.

z.B. für $A \rightarrow 1+2$ im 4-Körperfall $\leftarrow$ s. Übung, Aufgabe 17

nützlich: Phasenraumintegration Lorentz-invar. schreiben ($p = (p, \vec{p})$)

$$\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} 2\pi \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \delta(p^2 - E^2) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p}$$

$$\left(\text{via } \delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|} \text{ für einfache Nullstellen } x_i \text{ von } f \right)$$

3.2 Streuprozesse

wichtige Vokabeln:

- elastische Streuung $1+2 \rightarrow 1+2$ / inelastische Streuung $1+2 \rightarrow 1+2+3+\dots$ oder $1+2 \rightarrow 3+4$ etc.
- exklusiver Prozeß / alle Streuprodukte werden untersucht
- Wirkungsquerschnitt σ / nur ein Teil der Streuprodukte werden identifiziert: z.B. $1+2 \rightarrow 3 + \text{"Rest"}$

Klassisch: Größe des Ziels, aus der folgt das er-Beugende T .

QFT: einbeut, hängt von v ($\propto E$) der T ab.

E-Abhängigkeit kann groß sein; bei "Resonanzmenge" wird viel größer!

genauer Def: s.u.

Klassisches Bild:

$$d\Omega = \text{Raumwinkel} = \sin\theta d\theta d\phi$$

$$\left(\int d\Omega = \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 4\pi \right)$$

einlaufendes Teilchen



• barn ("Scheune")

oft benutzte Einheit von σ . $1 \text{ barn} = 10^{-28} \text{ m}^2 = (10 \text{ fm})^2$

$\hat{=}$ geometrischer Querschnitt schauer Materie (z.B. Atom)

def. differentieller Streuungsquerschnitt $\frac{d\sigma}{d\Omega} := \frac{1}{L_{\text{ein}}} \frac{dN_{\text{aus}}}{d\Omega dt}$

Luminosität $= \frac{dN_{\text{aus}}}{dt dt}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Anzahl der in Richtung } \Omega = (\theta, \varphi) \\ \text{beobachteten auslaufenden } T. \\ \text{pro Zeit- und Flächeneinheit pro Raumwinkel} \end{array} \right.$

$$\left[\frac{d\sigma}{d\Omega} \right] = \frac{1}{\frac{1}{m^2 s}} = \frac{1}{s} = [\text{Fläche}]$$


$\rightarrow$ Ereignisrate = Wirkungsquerschnitt $\cdot$ Luminosität

def. totaler Wirkungsquerschnitt

$$\sigma = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \sin\theta \frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta, \varphi)$$

$$\left(\text{oft: } u := \cos\theta, \int_0^\pi d\theta \sin\theta = \int_{-1}^1 du \right)$$

Bsp: Streuung an harter Kugel



Frage: $\sigma = ?$

$$\text{hier } b \leq R \Rightarrow b = R \sin\alpha, \quad 2\alpha + \theta = \pi$$

$$= R \sin\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) = R \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Luminosität $L_{\text{ein}} = \frac{N_{\text{ein}}}{V} \cdot v$ Geschw. d. ein- (und aus-) laufender T .

zwischen $\theta, \theta + d\theta$ beobachtet man Teilchen aus $b, b + db$

$$\text{mit } db = -\frac{R}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta$$

$$\text{also } \frac{d^2 N_{\text{aus}}}{d\Omega dt} = \frac{1}{\sin\theta d\theta d\varphi} \cdot \frac{N_{\text{ein}} \cdot v}{V} \cdot \left| b db d\varphi \right|$$

$$= L_{\text{ein}} \frac{R \cos(\frac{\theta}{2}) \cdot \frac{R}{2} \sin(\frac{\theta}{2}) d\theta d\varphi}{\sin(\theta) d\theta d\varphi}$$

$$= L_{\text{ein}} \frac{R^2}{4} \quad \left(\text{da } \sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \right)$$



$$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}$$

und $\sigma = \int d\Omega \frac{R^2}{4} = \pi R^2$ ist klassischer Querschnitt der Kugel!

• Luminosität an Teilchenströmen

$A+B \rightarrow$ "irreguläres"

$m_B \neq 0 \rightarrow$ gebe uns Reizesystem im Teilchen B $A \xrightarrow{\vec{v}_A} B$

Normierung $\langle A|A \rangle = 1 = \langle B|B \rangle$

($\hat{=}$ nur ein T. A und ein T. B im gemeinsamen Volumen V)

Luminosität der empfindlichen ebenen A-Quelle ist dann

$$L_{\text{em}} = \frac{1}{V} |\vec{v}_A|$$

$\hookrightarrow$ Geschwindigkeit


$\hookrightarrow$ durchschaltete Teilchendichte

Geldene Regel für Streuprozesse

"Rezept" wie bei Zerfallrate: Amplituden ($\mathcal{M}$)

$\checkmark$ dynamische Information; hier: $\rightarrow$ Feynmanregeln, s.u.

Phasenraum $\leftarrow$ kinematische Information; $\eta, E, \vec{p}$



$$\hat{H} = H_0 + g \hat{V} \quad \text{mit} \quad g \hat{V} = \int d^3x \mathcal{H} \hat{\phi}_1 \hat{\phi}_2 \hat{\phi}_1 \hat{\phi}_2$$

berechnen wieder (vgl. S. 25, 26) Streumatrixelement im 1. Ordn. $S_{fi}^{(1)}$

$$\text{endl. T.} \rightarrow \frac{1}{(2\pi)^2 E_f} e^{-i p_f x} \quad , \quad \text{ausl. T.} \rightarrow \frac{1}{(2\pi)^2 E_i} e^{+i p_i x}$$

$$\begin{aligned} S_{fi} &= -i \langle \phi(\vec{r}_1) \phi(\vec{r}_2) | \int d^4x \mathcal{H} \hat{\phi}_1 \hat{\phi}_2 \hat{\phi}_1 \hat{\phi}_2 | \phi_i(\vec{r}_1) \phi_i(\vec{r}_2) \rangle \\ &= -i (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \frac{\mathcal{M}}{(2\pi)^2 E_f \sqrt{p_1 p_2} \sqrt{q_1 q_2}} \end{aligned}$$

und, wie oben: $\text{Rate} = \frac{|S_{fi}|^2}{T}$; dabei: $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) \rightarrow V \cdot T$

integriere über alle $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ für festes Einheitsgeschwindigkeit

2 ohne Wellen im Anfangszustand

$\rightarrow$ Rate für 2 Teilchen durch $[\mathcal{V}_{2,1}]^2$

$\Rightarrow \frac{dN_{\text{aus}}}{dt}$ totale Ereignisrate

$$\frac{1}{V 2 E_{q_1} 2 E_{q_2}} \int \frac{d^3 \vec{p}_1}{(2\pi)^3 2 E_{p_1}} \int \frac{d^3 \vec{p}_2}{(2\pi)^3 2 E_{p_2}} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) |\mathcal{M}|^2$$

$L_{\text{em}} \cdot \sigma$ (laut Def., S. 5. 28)

gebe uns Reizesystem im B (S. 5. 29 oben)

$$= \frac{|\vec{v}_A|}{V} \cdot \sigma$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{1}{F} \left| \int d^4x \mathcal{M} \right|^2 \quad \text{Geldene Regel}$$

$$\text{mit} \quad \int d^4x := \prod_{i=1}^4 \int \frac{d^3 \vec{p}_i}{(2\pi)^3 2 E_{p_i}} (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(\sum_{i=1}^4 p_i - q_1 - q_2 \right)$$

und Flussfaktor $F = 4 |\vec{v}_A| E_{q_1} m_B$ (m. 8-Rezept.)

$\hookrightarrow$ sieht hier nicht sehr L-invar. aus!

$\mathcal{M}$ ist L-invar (S. 5. 27), $|\mathcal{M}|^2$ und

$\rightarrow F$ in L-invar Form schreiben:

$$\begin{aligned} &= 4 \frac{|\vec{p}_A|}{E_{q_1}} E_{q_1} m_B = 4 \sqrt{q_1^2 m_B^2} = 4 \sqrt{(E_{q_1}^2 - m_B^2) m_B^2} \\ &= 4 \sqrt{(q_1 q_2)^2 - m_B^2 m_B^2} \quad (\text{denn } q_2 = (m_B, 0), q_1 = (E_{q_1}, \vec{q}_1)) \end{aligned}$$

insgesamt haben wir also die Geldene Regel in allg. Form



$$\sigma_{2 \rightarrow n} = \frac{1}{F} \int d^4x |\mathcal{M}|^2$$

$\hookrightarrow$ Amplitude

$$F = 4 \sqrt{(q_1 q_2)^2 - m_B^2 m_B^2}$$

Der Flussfaktor F kann auf verschiedene Art und Weise geschrieben werden:

$$\begin{aligned} &\text{z.B. mit Hilfe der kinematischen Invarianten } s := (q_1 + q_2)^2 \\ &F = 2 \sqrt{(2 q_1 q_2)^2 - 4 m_B^2 m_B^2} = 2 \sqrt{(s - q_1^2 - q_2^2) - 4 m_B^2 m_B^2} \\ &= 2 \sqrt{(s - m_B^2 - m_B^2)^2 - 4 m_B^2 m_B^2} \end{aligned}$$

((Bem.: S wird häufig verwendet, denn es ist

die Gesamtenergie im Schwerpunktssystem $= E_A + E_B = \sqrt{S}$;

denn: CMS $\vec{q}_A \rightarrow \vec{q}_B = -\vec{q}_A \Rightarrow \vec{q}_A = (E_A, \vec{q}_A)$

"center of mass system" $\vec{q}_B = (E_B, -\vec{q}_A)$

also $q_A, q_B = (E_A + E_B, \vec{0})$ mit $E_A = \sqrt{\vec{q}_A^2 + m_A^2}$, $E_B = \sqrt{\vec{q}_A^2 + m_B^2}$

und $(q_A, q_B)^2 = (E_A + E_B)^2 = S$)

oder z.B. im Schwerpunktssystem (CMS)

$$\begin{aligned} (q_A, q_B)^2 - m_A^2 m_B^2 &= (E_A E_B + \vec{q}_A^2)^2 - m_A^2 m_B^2 \\ &= E_A^2 E_B^2 + 2 E_A E_B \vec{q}_A^2 + (\vec{q}_A^2)^2 - m_A^2 m_B^2 \\ &= \vec{q}_A^2 (2 \vec{q}_A^2 + m_A^2 + m_B^2 + 2 E_A E_B) = \vec{q}_A^2 (E_A + E_B)^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F = 4(E_A + E_B) |\vec{q}_A|$$

Bsp: Phasenraumintegration für Zweikörper-Streuung

$$A+B \rightarrow 1+2 \text{ in CMS: } q_A \xrightarrow{\vec{q}_A} q_1 \xrightarrow{\vec{p}_1} q_2 \xrightarrow{\vec{p}_2}$$

$$\begin{aligned} d\sigma_{2\text{pt}} &= \frac{1}{4} d\vec{q}_2^2 |M|^2 \\ &= \frac{1}{4(E_A + E_B) |\vec{q}_A|} \frac{d^3 \vec{p}_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 \vec{p}_2}{(2\pi)^3 2E_2} \frac{d^3 \vec{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3} \delta^{(4)}(E_A + E_B - E_1 - E_2 - E_3) \delta^{(3)}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) |M|^2 \\ &\quad \text{nutze } \delta^{(4)} \text{ für } \vec{p}_3\text{-Integration. Nullsetzung in Beziehung: wobei } d\sigma \\ &= \frac{1}{(8\pi)^3} \frac{|M|^2}{|\vec{q}_A| (E_A + E_B)} \frac{d^3 \vec{p}_1}{(2\pi)^3} \frac{\delta(\sqrt{m_1^2 + \vec{p}_1^2} + \sqrt{m_2^2 + \vec{p}_1^2} - E_A - E_B)}{\sqrt{m_1^2 \vec{p}_1^2 + m_2^2 \vec{p}_1^2}} \end{aligned}$$

wann kann $|M|^2$ abhängen?

$$\begin{aligned} |M|^2 &= |M|^2(\vec{q}_A, \vec{q}_B, \vec{p}_1, \vec{p}_2) = |M|^2(\vec{q}_A, -\vec{q}_A, \vec{p}_1, -\vec{p}_1) = |M|^2(\vec{q}_A, \vec{p}_1) \\ &= |M|^2(\vec{q}_A, \vec{p}_1, \vec{q}_A, \vec{p}_1) = |M|^2(|\vec{q}_A| |\vec{p}_1|, \cos\theta) \end{aligned}$$

da $|M|^2$ ein Skalar sein muss

Schreibe $\vec{p}_1$ -Integration in Kugelkoordinaten um $\vec{q}_A$

$$\vec{q}_A \xrightarrow{\vec{p}_1} \vec{q}_1 \quad d^3 \vec{p}_1 = p^2 dp \, d\Omega, \quad p \equiv |\vec{p}_1|$$

$$d\Omega = \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

substituiere $S \rightarrow E := \sqrt{m_1^2 + p^2} + \sqrt{m_2^2 + p^2}$ in Radialintegration

$$\Rightarrow dE = \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{m_1^2 + p^2}} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{m_2^2 + p^2}} \right) 2p dp = E \frac{p dp}{\sqrt{m_1^2 + p^2} \sqrt{m_2^2 + p^2}}$$

$$\text{und } S(E) = \frac{1}{2E} \sqrt{E^4 - 2E^2(m_1^2 + m_2^2) + (m_1^2 - m_2^2)^2}$$

$$\text{((denn: } E^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2p^2 + 2\sqrt{p^2} \sqrt{p^2}$$

$$(E^2 - m_1^2 - m_2^2 - 2p^2)^2 = 4(m_1^2 + p^2)(m_2^2 + p^2)$$

$$\begin{aligned} E^4 + m_1^4 + m_2^4 + 4E^2 - 2E^2 m_1^2 - 2E^2 m_2^2 - 4E^2 p^2 + 4m_1^2 p^2 + 4m_2^2 p^2 \\ = 4m_1^2 m_2^2 + 4m_1^2 p^2 + 4m_2^2 p^2 + 4p^4 \end{aligned}$$

diese Abg. nach S^2 auflösen

lassen und wird $E_A + E_B = \sqrt{S}$ in CMS verwendet

$$\frac{d\sigma_{2\text{pt}}}{d\Omega} = \frac{1}{(8\pi)^2} \frac{1}{|\vec{q}_A| |\vec{p}_1|} \int_{m_1+m_2}^{\infty} \frac{dE}{E} S(E) |M|^2 (|\vec{q}_A|, S(E), \cos\theta) \cdot S(E - \sqrt{S})$$

Deltafkt setzt nur für $\sqrt{S} > m_1 + m_2$ zu!

$$= \frac{1}{(8\pi)^2} \frac{1}{|\vec{q}_A| |\vec{p}_1|} \frac{1}{\sqrt{S}} S(\sqrt{S}) |M|^2 (|\vec{q}_A|, S(\sqrt{S}), \cos\theta) \cdot \Theta(\sqrt{S} - m_1 - m_2)$$

also $S = |\vec{p}_1|^2$, s.o., so daß $S(\sqrt{S})$ das durch


E-p-Erhaltung fixierte $|\vec{p}_1|$ ist

$$= \frac{1}{(8\pi)^2} \frac{1}{|\vec{q}_A|} \frac{|M|^2 (|\vec{q}_A|, |\vec{p}_1|, \cos\theta)}{(E_A + E_B)^2}$$

- Bem.:
- konnten für 2→2 Streuung also Phasenraumintegration ohne explizite Kenntnis von $|M|^2$ ausfallen!
 - im Allgemeinen geht das nicht bei $2 \rightarrow n > 2$
 - haben in CMS gemacht, und $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ durch Variablen in diesem System ausgedrückt.
 - manchmal bequemer: Lorentz-invariante Variablen $\begin{cases} S = (q_A + q_B)^2 \\ t = (q_A - p_1)^2 \\ u = (q_A - p_2)^2 \end{cases}$
- L-MV: m_A, m_B, m_1, m_2 ; Mandelstam-Variablen 2.5. Übung, Aufgabe 21

- bei $2 \rightarrow n > 2$ Streuung ist die Klammerbildung etwas komplizierter, z.B.

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{c} p_1 \\ \swarrow \\ p_2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} p_1 \\ \swarrow \\ p_2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} p_1 \\ \swarrow \\ p_2 \end{array} \\
 & \Rightarrow \left. \begin{array}{l} s_{12} := (p_1 + p_2)^2 \\ s_{13} := (p_1 + p_3)^2 \\ s_{23} := (p_2 + p_3)^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} s_{12} + s_{13} + s_{23} = \\ = (p_1 + p_2 + p_3)^2 = p_{\text{tot}}^2 \\ = s + m^2 + m^2 + m^2 = \text{const.} \\ \rightarrow \text{dies genügt!} \end{array}
 \end{aligned}$$



"Dreh-Platz" stellt die erlaubte Region dar. Jeder Punkt $\hat{=}$ einer Geometrie des Endzustandes

- eine tiefgelegene Behandlung der Phasenumintegration ist z.B. in [Feynman/Kinematik, "Nicht-Interaktion, 3-body phase space"]
- jetzt fällt uns nur noch eine Methode, um M^2 zu berechnen! das geht am besten mit "Feynman-Diagrammen", die graphisch sehr anschaulich sind, und sich daher als eine "Sprache" in der Teilchenphysik durchgesetzt haben.

3.3 Feynman-Regeln

$\hat{=}$ Algorithmus zur Berechnung der Amplitude M in quantenfeldtheoretischen Prozessen
mathematischen Ausdrücken unter graphische Bausteine zugeordnet

① Externe Linien

wenden sich ihren Vertikals bezeichnet

Spin $\frac{1}{2}$ -Teilchen: zusätzl. Helizität s

Spin 1-Teilchen: zusätzl. Polarisation λ

$\rightarrow p, s$ --- Spin-0-T., Vertikal $p \Rightarrow sM = 1$

$\rightarrow p, s, \lambda$ --- Spin-1-T. (Photon) $\Rightarrow sM = \epsilon_{\mu\nu}(\vec{p})$

$\rightarrow p, s$ --- Spin- $\frac{1}{2}$ -T. (Elektron) $\Rightarrow sM = u(p, s)$, $sM = \bar{u}(\vec{p}, s)$

$\rightarrow p, s$ --- Spin- $\frac{1}{2}$ -Antit. (Positron) $\Rightarrow sM = \bar{v}(\vec{p}, s)$, $sM = v(p, s)$

auslaufende T. $\uparrow t$

einlaufende T. $\downarrow t$


Bsp: $e^-(q_{1,s}) + e^+(q_{2,s}) \rightarrow \gamma(p_1, \lambda, R) + \gamma(p_2, \lambda, R)$

② Vertices: sind durch $g^{\mu\nu}$ in $M = \bar{u}_0 + g^{\mu\nu}$ bestimmt.

genauer: in Zeitentwicklung-Operatoren kommt $-i \int dt^0 \mathcal{L}_I(t)$ vor. in Lagrange-Formalismus ist das $+i \int dt^0 \mathcal{L}_I$

mit Lagrange-Dichte $\mathcal{L}_I$ (= Polynom in Feldoperatoren)

allgemein: $\mathcal{L}_I = g_{ijkl} \hat{\psi}_i \hat{\psi}_j \hat{\psi}_k \hat{\psi}_l + g_{ijkl} \hat{\psi}_i \hat{\psi}_j \hat{\phi}_k \hat{\phi}_l + \dots$



③ Interne Linien: falls ein Feynman-Diagramm (s.o.) interne Linien hat, entspricht jede dieser Linien einem "Propagator".

Dieser hängt von Impuls/Masse/Art des Teilchens ab, hat aber keinen Spin- bzw. Polarisations-Zustand: es ist über alle Möglichkeiten summiert.

$\rightarrow p$ --- $\Leftrightarrow sM = \frac{i}{p^2 - m^2}$


Photon $\Leftrightarrow sM = \frac{i}{p^2} (-g_{\mu\nu})$

$\rightarrow p$ --- $\Leftrightarrow sM = \frac{i}{p^2 - m^2} (p^{\mu\nu})$ $\leftarrow$ Vollständigkeitsrelation vgl. Skript S. 21


(Herleitung: die genau Analogie für Propagator folgt aus M_0)

- ④ E-P-Erhaltungen am jeden Vertex muß der Vertikals erhalten sein
- ⑤ interne Impulse werden per $\int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4}$ überintegriert
- ⑥ Antisymmetrisierung (-1) für jede geschlossene Fermion-Schleife.
- (-1) zwischen Diagrammen, die sich nur durch Austausch von zwei externen Fermionen unterscheiden.
- ⑦ Gesamtphase alles mit (i) multiplizieren (für M^2 egal)

Bsp Wie gegeben durch $\hat{\mathcal{L}}_I = -\bar{\psi} \hat{\gamma}_\mu \psi A_\mu$



$$\mathcal{M} = (-ig)^2 (i) = 2$$



$$\mathcal{M} = (-ig)^2 \left(\frac{i}{(q_1 p)^2 - m^2} \right) (i) = \frac{2}{(q_1 p)^2 - m^2}$$



$$\mathcal{M} = (-ig)^4 \left(\frac{i}{(q_1 p)^2 - m^2} \right)^2 \left(\frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \right) \left(\frac{i}{k^2 - m^2} \right) \left(\frac{i}{(q_1 p + k)^2 - m^2} \right) (i) = \frac{ig^4}{[(q_1 p)^2 - m^2]^2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k^2 - m^2) [(q_1 p + k)^2 - m^2]}$$

4. Quantenelektrodynamik (QED)

Entwicklung: 1946-51 Feynman, Schwinger, Tomonaga; (Nobel 1965)

QED ist die am genauesten verifizierte Theorie der Physik!

magnetisches Moment des e^-

((μ) Entzünden des "bolischen Diagramms" $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$))

$$\frac{\mu_e}{\mu_B} = 1.00115965218073 (28) \leftarrow \text{experimentell gemessen}$$

Unsicherheit der letzten beiden Ziffern [Harvard, 2008]

s. arXiv:0801.1134

$$= 1.001159652183 (7) \leftarrow \text{theoretisch berechnet}$$

[s. arXiv:0712.2607]

Relevanz: QED beschreibt (u.a.) Wechselwirkungen von e^- & γ

$\rightarrow$ alle Phänomene z.B. der Chemie folgen aus QED!

Formulierung der QED:

$$\hat{\mathcal{L}}_I = e \bar{\psi} \gamma_\mu \hat{A}_\mu \psi$$

Elementarladung e

besser zu merken:

$$\text{Feynman-Konstante } \alpha_{EM} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.035999...}$$

$$\Rightarrow \text{Vertex: } i e \gamma^\mu \Rightarrow \delta \mathcal{M} = i e \gamma^\mu$$

kommen aus Feynman-Diagramme der niedrigsten Prozesse heraus:

Prozess erster Ordnung



magnetisches Moment des e^-
 $\mu_e/\mu_B = 1$

elektrische Prozesse zweiter Ordnung



Elektron-Muon-Streuung: $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$
"Mott-Streuung": $m_\mu \rightarrow \infty$
"Rutherford-Streuung": $v_e \rightarrow 0$ ($e^- p^+ \rightarrow e^- p^+$)



Elektron-Elektron-Streuung: $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$
"Møller-Streuung"



Elektron-Positron-Streuung: $e^- e^+ \rightarrow e^- e^+$
"Bhabha-Streuung"



Elektron-Photon-Streuung: $e^- \gamma \rightarrow e^- \gamma$
"Compton-Streuung"

inelastische Prozesse zweiter Ordnung



Paarvernichtung: $e^- e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$



Paarzeugung: $\gamma + \gamma \rightarrow e^- e^+$

wichtigster Prozess dieser Ordnung



"Stellungs korrekturen"
zum mag. Moment des e^-
ob.: "anomales" mag. Moment des e^-

((gute Herleitung der Dispersionsrelation Korrekturen:

2 neue Vertices $\rightarrow e^2$. jede "Selbste" gilt $\frac{1}{(4\pi)^2}$

$$\rightarrow \frac{e^2}{16\pi^2} = \frac{\alpha_{ED}}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \approx \frac{1}{1320} \quad ?$$


die genaue Antwort ist $\frac{\alpha_{ED}}{2\pi} \approx \frac{1}{861} \approx 0.0011617...$

vgl. mit (5.0.) $\frac{1}{137} = 1.0011596... \quad (\text{exp.}) \quad ! \quad)$

etc... Teilchenphysik als "Puzzlespiel" mit Feynmangraphen!

Nun können wir aber mit Hilfe der Feynman-Regeln (s. § 3.3) die Amplituden berechnen.

Bsp.: Amplitude für e^-e^- -Streuung



Zur Anwendung der Feynman-Regeln: jede Fermionlinie "rückwärts" verlaufen

$$M = \bar{u}(p_1, s_1) i e \gamma^\mu u(q_1, s_1) \bar{u}(p_2, s_2) i e \gamma^\nu u(q_2, s_2) \frac{-i g_{\mu\nu}}{(q^2 - \mu^2)^2} (i e) \quad (1)$$

① ② ① ② ① ② ③
aus. e^- -Linie Vertices Propagator Vertices einstr. e^- -Linie

$$= -\frac{e^2}{(q_1 p_1)^2} \bar{u}(p_1, s_1) \gamma^\mu u(q_1, s_1) \bar{u}(p_2, s_2) \gamma^\nu u(q_2, s_2)$$

- Bem:
- für gegebene $\vec{p}, \vec{q}, s_i$ ist dies eine Zahl!
 - falls es mehrere Diagramme gleicher Ordnung gibt: Addition/Subtraktion (Regel ③), z.B.
 $|M|^2 = |M_1|^2 + |M_2|^2 \pm (M_1 M_2^* + M_2 M_1^*)$
 - letzter Term: repräsentiert gen. Interferenz!

Behandlung der Spinalabhängigkeit

Annahme ($\hat{=}$ den meisten Experimenten): Spinorientierungen des Anfangszustandes seien zufällig verteilt, und im Endzustand und die Spinorientierung der einzelnen Teilchen nicht gemessen.
 $\rightarrow$ Mittelwert über alle Spinkonfigurationen im Anfangszustand
Summe $\rightarrow$ Endzustand

$$\rightarrow |M|^2 \rightarrow \langle |M|^2 \rangle = \frac{1}{4} \sum_{s_1=s_2} \sum_{s_3=s_4} |M|^2$$

in unserem Bsp ist

$$|M|^2 = \frac{e^4}{(q_1 p_1)^4} \sum_{s_1} \bar{u}(p_1, s_1) \gamma^\mu u(q_1, s_1) \left[\bar{u}(p_2, s_2) \gamma^\nu u(q_2, s_2) \right]^* \bar{u}(q_1, s_1) \gamma_\mu u(p_1, s_1) \bar{u}(q_2, s_2) \gamma_\nu u(p_2, s_2)$$

$\hat{=}$ ein Skalar (keine Matrix; oder: 1x1-Matrix)

$$= \left[\bar{u}(p_2, s_2) \gamma^\nu u(q_2, s_2) \right]^* = \left[u^\dagger(p_2, s_2) \gamma^\nu u(q_2, s_2) \right]^*$$

$$= u^\dagger(q_2, s_2) \gamma^\nu u^\dagger(p_2, s_2) = \bar{u}(q_2, s_2) \gamma^\nu u(p_2, s_2)$$

$$= \gamma^\nu \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 = \gamma^\nu \gamma^\mu \quad (\text{s. Übung, Aufgabe 106})$$

also mit Mittelwert und Summe:

$$\langle |M|^2 \rangle = \frac{e^4}{4(q_1 p_1)^4} \sum_{s_1=s_2} \bar{u}(p_1, s_1) \gamma^\mu u(q_1, s_1) \bar{u}(q_1, s_1) \gamma_\mu u(p_1, s_1) \quad *$$

$$* \bar{u}(p_2, s_2) \gamma_\nu u(q_2, s_2) \bar{u}(q_2, s_2) \gamma^\nu u(p_2, s_2)$$

Spinsumme? Vollständigkeitsrelation (s. S. 21)! $\sum_s u(p, s) \bar{u}(p, s) = \not{p} + m$
 außerdem gilt (für eigenständige 4x4-Matrix M)

$$\sum_s \bar{u}(p, s) M u(p, s) = \sum_s \bar{u}(p, s) M_{\alpha\beta} u(p, s) = \sum_s M_{\alpha\beta} u_\beta(p, s) \bar{u}_\alpha(p, s) = \sum_s \text{Tr}(M u(p, s) \bar{u}(p, s)) = \text{Tr}(M (\not{p} + m))$$

also ist insgesamt

$$\langle |M|^2 \rangle = \frac{e^4}{4(q_1 p_1)^4} \text{Tr} \left[\gamma^\mu (\not{q}_1 + m) \gamma^\nu (\not{q}_2 + m) \right] \text{Tr} \left[\gamma_\mu (\not{p}_1 + m) \gamma_\nu (\not{p}_2 + m) \right]$$

- Bem:
- faktorisiert in e^- - und μ^- -Anteil
 - keine Spinsumme mehr!
 - brauchen jetzt Spinn über μ^- -Nutzern

Spuren über γ -Nukleonen:

es gilt (s. Übungen, Aufgabe 25)

$$S_F(\gamma^0 \gamma^0) = 4 g^{\mu\nu}$$

$$S_F(\gamma^0 \gamma^0 \gamma^0) = 0$$

$$S_F(\gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0) = 4 (g^{\mu\nu} g^{\sigma\tau} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\tau} + g^{\mu\tau} g^{\nu\sigma})$$

((und, natürlich, $S_F(A+B) = S_F(A) + S_F(B)$; $S_F(cA) = c S_F(A)$;

$S_F(AB) = S_F(BA)$; für Nukleonen A, B und ZuU .)

so daß für unser $\gamma\gamma$ gilt

$$S_F[\gamma^0 (g_{\mu+m_e}^{\mu} \gamma^{\mu} (g_{\mu+m_e}^{\mu} \gamma^{\mu}))] = (g_{\mu+m_e}^{\mu} (g_{\mu+m_e}^{\mu} S_F[\gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0] + \dots S_F[\gamma^0 \gamma^0]) + m_e^2 S_F[\gamma^0 \gamma^0])$$

$$= 4 (g_{\mu+m_e}^{\mu} (g_{\mu+m_e}^{\mu} (g^{\mu\nu} \gamma^{\mu} - g^{\mu\nu} \gamma^{\mu} + g^{\mu\mu} \gamma^{\nu} + g^{\mu\nu} \gamma^{\mu})) + k_{\mu+m_e}^{\mu} g^{\mu\nu})$$

$$= 4 (g_{\mu+m_e}^{\mu} \gamma^{\mu} + g_{\mu+m_e}^{\mu} \gamma^{\mu} + g^{\mu\nu} (m_e^2 - g_{\mu+m_e}^{\mu}))$$

also insgesamt

$$\begin{aligned} \langle M^2 \rangle &= \frac{4e^4}{(g_{\mu+m_e}^{\mu})^4} \left\{ g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} + g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} (m_e^2 - g_{\mu+m_e}^{\mu}) \right\} \cdot 2 \\ &\quad + (m_e^2 - g_{\mu+m_e}^{\mu}) (g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} + g^{\mu\nu} g_{\mu+m_e}^{\mu} (m_e^2 - g_{\mu+m_e}^{\mu})) \Big\} \\ &= \frac{8e^4}{(g_{\mu+m_e}^{\mu})^4} \left\{ g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} - m_e^2 g_{\mu+m_e}^{\mu} g_{\mu+m_e}^{\mu} + 2 m_e^2 m_e^2 \right\} \\ &= g_{\mu+m_e}^{\mu} = S_F(\gamma^0 \gamma^0) = 4 \end{aligned}$$

Bem: • haben L -minimales Resultat für $\langle M^2 \rangle$ gefunden

• können dies jetzt z.B. auf 5.32 einsetzen

$$\rightarrow \frac{d\sigma_{\gamma\gamma}}{d\Omega} = \dots$$

(oder in den L -minimierten Ausdruck von Aufgabe 22!)

• für $m_p \gg m_e$ (vgl. $m_p \approx 106 \text{ MeV}$, $m_e \approx 0.511 \text{ MeV}$)
folgt dann der Übergangswahrscheinlichkeit für "Not-Strahlung"
und daraus für $v_e \ll 1$ die "Rutherford-Formel"

Einschleis mehr zum magnetischen Moment des Nukleons

(S.S. 36/37); mag. Moment des anderen Nukleons verschoben von μ_e ?

$$\text{Proton } (e^-, \mu^+, \tau^-) \approx (0.511, 105.7, 1780) \text{ MeV}$$

$$1. \text{ Ordnung: } \gamma \Rightarrow \mu_e = \frac{e}{2m_e} \equiv \mu_B, \quad \frac{\mu_p}{\mu_B} = 1 \quad (\text{in 1. Ord.})$$

$$\text{also } \gamma \Rightarrow \mu_p = \frac{e}{2m_p}, \quad \gamma \Rightarrow \mu_e = \frac{e}{2m_e}$$

$$3. \text{ Ordnung: wichtigstes Diagramm } \Rightarrow \text{Korrektur } \frac{\delta \mu_p}{\mu_B} = \frac{e^2}{8\pi^2} = \frac{q_{ED}}{2\pi}$$

((diese Korrektur kommt vom Schleifenintegral (vgl. Regel 5),

in dessen Integral die Propagatoren (vgl. Regel 3) stehen.

Propagatoren enthalten Massen (hier: m_e), da als korrekte

(zu $\frac{\mu_p}{\mu_B} = 1$) aber dim.-lose Zahl herauskommen muss, kann

das Ergebnis nicht von m_e abhängen $\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{q_{ED}}{\pi}$))

$$\text{also z.B. } \gamma \Rightarrow \text{Korrektur } \frac{\delta \mu_p}{e/2m_p} = \frac{q_{ED}}{2\pi} = \frac{\delta \mu_p^{(1)}}{e/2m_p} !$$



$$5. \text{ Ordnung: wichtigstes Diagramm: } \gamma \Rightarrow \frac{\delta \mu_p^{(2)}}{\mu_B} = \left(\frac{q_{ED}}{\pi} \right)^2 \sum_{i \in \{1,2\}} a \left(\frac{m_i}{m_e} \right)$$

((wobei die Korrektur von Zwei-Schleifen Integral kommt:

$$m \gamma \sim a \left(\frac{m_i}{m_e} \right) \text{ muß wieder Zahl sein, kann also nur von Verhältnissen der Massen abhängen}$$

dieses Integral ist berechnet [Li/Model/Sammel, PRD 47 (1993) 1723]

$$\text{wobei z.B. } a(1) = \frac{119}{36} - \frac{\pi^2}{3} \approx 0.016$$

$$a(2) = -\frac{1}{2} \ln(4) - \frac{25}{36} + 0.66; \quad a \left(\frac{m_e}{m_p} \right) \approx a \left(\frac{1}{207} \right) \approx 1.08$$

$$a \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{5}{4} + O(\epsilon^4); \quad a \left(\frac{m_e}{m_p} \right) \approx a(17) \approx 7.7 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{\delta \mu_p^{(2)}}{e/2m_p} = \left(\frac{q_{ED}}{\pi} \right)^2 [a(1) + a(207) + a(3483)] \approx 0.016 + 7.2 \cdot 10^{-3} + 1.8 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{\delta \mu_p^{(1)}}{e/2m_p} = \left(\frac{q_{ED}}{\pi} \right)^2 [a \left(\frac{1}{207} \right) + a(1) + a(17)] \approx 1.08 + 0.016 + 7.7 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{\delta \mu_p^{(1)}}{e/2m_p} = \left(\frac{q_{ED}}{\pi} \right)^2 [a \left(\frac{1}{207} \right) + a \left(\frac{1}{17} \right) + a(1)] \approx 2.02 + 0.25 + 0.016$$

(Trotz: Schleife mit dem äußeren Teilchen, hier: e^- , gilt aber größtm. Beitrag)

Anwendung: Notte- und Rutherford-Formel

$m_p \approx 106 \text{ MeV} \gg m_e \approx 0.511 \text{ MeV}$

→ betrachte den Grenzwert $m_p \rightarrow \infty$

((CPS $\approx$ Libermann); da $N_{\text{gen}} \rightarrow \infty$, Bildsch. vernachlässigbar))

$$\begin{aligned} \vec{p}_1 &= (E_1, \vec{p}_1), \quad \vec{p}_2 = (E_2, \vec{p}_2) = \gamma_p \left(\frac{1 + \frac{E_1^2}{m_p^2}, -\frac{\vec{p}_1}{m_p} \right) \approx \gamma_p (\vec{0}) \\ \vec{q}_1 &= (E_1, \vec{q}_1), \quad \vec{q}_2 = (E_2, \vec{q}_2) = \gamma_p \left(\frac{1 + \frac{E_1^2}{m_p^2}, -\frac{\vec{q}_1}{m_p} \right) \approx \gamma_p (\vec{0}) \end{aligned}$$

E-Erhaltung: $E_1 + m_p + 0(\frac{1}{m_p}) = E_2 + m_p + 0(\frac{1}{m_p}) \Rightarrow \vec{q}_1^2 = \vec{q}_2^2$

nach Ausführen der Phasenraumintegration hatten wir (S.5.32)

erhalten: $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{(8\pi)^2} \frac{|\vec{p}_1|}{|\vec{q}_1|} \frac{1}{(E_1 + E_2)^2} = 1 \text{ vgn. E-Erhaltg}$

nun das Ergebnis für $<1M^2>$ von S.39 einsetzen

hier: $(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)^2 = (E_1 - E_2)^2 - (\vec{q}_1 - \vec{q}_2)^2 = -2\vec{q}_1^2(1 - \cos\theta) = -4\vec{q}_1^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$

$\vec{q}_1 \cdot \vec{q}_2 = E_1 E_2 - \vec{q}_1 \cdot \vec{q}_2 = E_1 E_2 - q_1 q_2 \cos\theta = m_e^2 + 2\vec{q}_1^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$

$\vec{q}_1 \cdot \vec{p}_1 = E_1 E_1 - \vec{q}_1 \cdot \vec{p}_1 = m_e^2 + \vec{q}_1^2 - \vec{q}_1^2 \cos\theta = m_e^2 + 2\vec{q}_1^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$

$\vec{q}_2 \cdot \vec{p}_2 = m_p^2$
 $E_1 + E_2 = m_p \left(\frac{m_p^2 + \vec{q}_1^2}{m_p^2} + 1 \right) \approx m_p + O(\frac{1}{m_p})$

$\frac{1}{(8\pi)^2} \frac{1}{m_p^2} \frac{1}{(-4\vec{q}_1^2 \sin^2 \frac{\theta}{2})^2} \left(2m_e^2 m_p^2 + 2m_p^2 \vec{q}_1^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \right)$


$= \left(\frac{\alpha_{\text{em}}^2}{2\vec{q}_1^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \right)^2 \left(m_e^2 + \vec{q}_1^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \right) \quad \text{"Notte-Formel"}$

Sam: • ist gute Näherg für e-p-Streuung, da $m_p \approx 938 \text{ MeV} \gg m_e$

falls das Elektron nichtrelativistisch ist (also $|\vec{q}_1| = m_e v \ll m_e$),

ergibt sich die "Rutherford-Formel":

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{\alpha_{\text{em}}}{2m_e v \sin^2 \frac{\theta}{2}} \right)^2$



5. Starke Wechselwirkungen, Quantenchromodynamik (QCD)

Im letzten Kapitel: QED, Theorie der elektromagnetischen Wechselw.

konvergiert sehr gut ($\alpha_{\text{em}} \approx \frac{1}{137}$)

experimentell außer ganzem verstanden (z.B. p_q)

→ "Langweilig"

jetzt: komplexere Wechselw.

viele verschiedene Näherungsmethoden, neue Beispiele

→ "interessant"

Behandlung hier jedoch nur qualitative.

Erhaltung: e (Positron)

QED $\hat{=}$ ungeladene T.; Vermittlung: Photon; Stärke: $g_e = \sqrt{4\pi\alpha_{\text{em}}}$

QCD $\hat{=}$ ungeladene T.; Vermittlung: Gluon; Stärke: $g_s = \sqrt{4\pi\alpha_s}$

→ Farb-Erhaltung

Quantenmodell

historisch: 1959-64; Gell-Mann, Ne'eman, Zweig

siehe [D.W. Greenberg, Am. J. Phys. 50 (1982) 1074]

leichte Quarks: u ($m \approx 2 \text{ MeV}$), d ($\approx 5 \text{ MeV}$), s ($\approx 100 \text{ MeV}$)

schwere Quarks: c ($m \approx 1.25 \text{ GeV}$), b ($\approx 4.2 \text{ GeV}$), t ($\approx 174 \text{ GeV}$)

durch Beobachtung der leichten Quarks (Mesonen mit $S_{\text{fl}} = 0, 1, \dots$)


zu Beginn mit $S_{\text{fl}} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$ kann man etwas über die leichten Quarks erfahren!

Klassifizierung durch Gell-Mann ("der Fundamentale der Teilchenphysik")

$J = 0$ - Mesonen:

"der achtfache Weg"

(η' schon als $\omega(782)$)



Spektraltab: $\pi_{\text{mes}} = \text{Quark} + \text{Antiquark}$



alle Kombinationen $\Rightarrow 3 \cdot 3 = 9$ Mesonen!

[Gruppen Theorie: $3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$, $1 = \eta'$]

funktioniert nicht nur für $\text{Spin}=0$ ($\pi, \rho, \dots$),

sondern auch für $\text{Spin}=1$ Mesonen ($\pi^*, \rho^*, \dots$), $\text{Spin}=\frac{1}{2}$ Baryonen (Λ, Σ),

$\text{Spin}=\frac{3}{2}$ Baryonen (Δ)

Bestätigung des Quarkmodells: experimentell!

es "fehlte" eine Ecke im Baryonendekuplett (das Ω^- , sss).

1964 experimentell entdeckt.

(vgl. Nudelmann: es "fehlten" Gallium, Selenium, Germanium im Periodensystem $\rightarrow$ Vorhersage!)

Frage: • warum sieht man keine freien Quarks?

• steht z.B. sss nicht im Widerspruch zum Pauli-Prinzip?

$\rightarrow$ neue Einschlüpf: Farne.

Quarks haben drei Farne/Antifarne (nehmen wir r, g, b / $\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}$)

als freie Teilchen treten nur farblose Kombinationen auf

dies ist Hypothese! kommt wieder experimentell bestätig.


$\rightarrow$ starke innere Struktur der Nukleonen.

Nukleonenerzeugung in e^+e^- -Kollisionen

Quarks sind (d.) geladen (s.o.)


$\rightarrow$ Spin em. W, $\hat{Q} \neq 0$

idea: $e^+e^- \rightarrow \gamma \rightarrow q\bar{q}$



generell:

[z.B. SLAC, LEP]



können die erste Stufe dieses Prozesses mit den QED-Regeln aus Kapitel 4 berechnen, analog zu $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$:

alle CMS, $E = \text{Energie des einl. } e^-$

$Q_i \equiv$ Ladung des q_i (in Einheiten von e), $m_i \equiv$ Masse des q_i

$$((S.37-39: \text{Diagramm}), \text{folgt: } \frac{8Q_i^2 e^4}{(2E)^4} \{ q_1 p_1 q_2 p_2 + q_1 p_1 p_1 q_2 + m_i^2 q_1 q_2 + m_i^2 p_1 p_2 + 2m_i^2 m_i^2 \})$$

$$\Rightarrow \langle |M|^2 \rangle = \sum_{\text{Farne}} \frac{8Q_i^2 e^4}{(2E)^4} \{ q_1 p_1 q_2 p_2 + q_1 p_1 p_1 q_2 + m_i^2 q_1 q_2 + m_i^2 p_1 p_2 + 2m_i^2 m_i^2 \}$$

$$\text{CMS: } \vec{q}_1 = -\vec{q}_2, \vec{p}_1 = -\vec{p}_2$$

$$E\text{-Labf: } 2E = E_1 + E_2 = 2E, \Rightarrow E_1 = E_2 = E, E_1^2 = E_2^2 = E^2$$

$$\vec{q}_1^2 + m_i^2 = \vec{p}_1^2 + m_i^2$$

$$= \sum \frac{8Q_i^2 e^4}{(2E)^4} \{ (E^2 - \vec{q}_1 \cdot \vec{p}_1)^2 + (E^2 + \vec{q}_1 \cdot \vec{p}_1)^2 + m_i^2 (E^2 + \vec{q}_1 \cdot \vec{p}_1)^2 + m_i^2 (E^2 - \vec{q}_1 \cdot \vec{p}_1)^2 + 2m_i^2 m_i^2 \}$$

$$= \sum \frac{Q_i^2 e^4}{E^4} \{ E^4 + m_i^2 E^2 + m_i^2 E^2 + (E^2 - m_i^2)(E^2 - m_i^2) \cos^2 \theta \}$$

$$= \sum \frac{Q_i^2 e^4}{E^4} \{ E^4 + m_i^2 E^2 + m_i^2 E^2 + (E^2 - m_i^2)(E^2 - m_i^2) \cos^2 \theta \}$$

$$= \sum \frac{Q_i^2 e^4}{E^4} \{ E^4 + m_i^2 E^2 + m_i^2 E^2 + (E^2 - m_i^2)(E^2 - m_i^2) \cos^2 \theta \}$$

also folgt moment für den totalen Wirkungsquerschnitt

$$\sigma_{\text{tot}} = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \frac{1}{4} \frac{E^4 - m_i^2 E^2}{(E^2 - m_i^2)^2} \leq \frac{|M|^2}{(2E)^2} \theta(E - m_i)$$

$$= \sum_{\text{Farne}} \frac{Q_i^2 e^4}{E^4} \frac{1}{4} \frac{E^4 - m_i^2 E^2}{(E^2 - m_i^2)^2} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_i^2}{E^2} \right) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_i^2}{E^2} \right) \theta(E - m_i)$$

$$= \sum_{\text{Farne}} \frac{Q_i^2 e^4}{E^4} \frac{1}{4} \frac{E^4 - m_i^2 E^2}{(E^2 - m_i^2)^2} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_i^2}{E^2} \right) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_i^2}{E^2} \right) \theta(E - m_i)$$


$$= N_c \cdot \sum_{\text{Farne}} \frac{Q_i^2}{3} \left(\frac{e^4}{E^4} \right)^2 \text{ for } E \gg m_i \gg m_e$$

$$N_c = 3$$

$$= N_c \cdot \sum_{\text{Farne}} \frac{Q_i^2}{3} \left(\frac{e^4}{E^4} \right)^2 \text{ for } E \gg m_i \gg m_e$$

for $E \gg m_i \gg m_e$

- Bem.: Schnellenergie (θ -Fkt): Proportional für $E < m_{\pi^0}$ verhalten; brauchen geringe Energie, um $q\bar{q}$ -Paar zu erzeugen!
- für große Strenken ist die Näherung der δ -Fkt. Zelle sehr gut: $\sqrt{1 - \frac{m_c^2}{E^2}} \left(1 + \frac{m_c^2}{2E^2}\right) \approx 1 - \frac{3}{8} \frac{m_c^4}{E^4} + \dots$ (eben zufällig)
 - (Korrektur in m_c ist $O(m_c^2/E^2)$, aber $m_c^2 \ll m_{\pi^0}^2$)
 - es werden faktoriell Prozesse beobachtet, die dem oben skizzierten Modell entsprechen:



$e^+e^- \rightarrow q\bar{q} \rightarrow \text{Hadronisierung}$
 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}G \rightarrow \text{Hadronisierung}$
 expl. Beweis für Existenz der Gluon!


- die Anzahl der Farben ist als $N_c = 3$ gemessen:
- $$R(E) = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{Hadronen})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} \approx N_c \cdot \sum_i Q_i^2 \cdot \theta(E - m_i)$$
- erwarten bei niedrigen Energien (up, d, s-Quarks tragen Le.)
- $$R \approx N_c \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \right] = \frac{2}{3} N_c$$
- zwischen c- und b-Schwelle $R \approx \left[\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] N_c = \frac{10}{3} N_c$
- über b-Schwelle $R \approx \left[\frac{10}{9} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] N_c = \frac{11}{9} N_c$
- über t-Schwelle $R \approx \left[\frac{11}{9} + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] N_c = \frac{13}{3} N_c$
- Siehe z.B. [hep-ph/0312114] oder auch [pdg.lbl.gov/2003] Exp.: hadronische-x-section / $\mu^+\mu^-$
-
- die Quark- und Farb-Hypothesen scheinen richtig zu sein!

Tiefenelastische e^+e^- -Streuung

wie z.B. am HERA / DESY, 1992-2007

→ präzise Untersuchung der inneren Struktur des Protons, und damit der Eigenschaften im Quark + Gluon.

Grundidee: Rutherford-Streuung → Zöll der unter großen Winkeln abgelenkten Teilchen deutet auf Atomstruktur hin (Kern).
 Tiefenelastische Streuung → Zöll der unter großen Winkeln abgelenkten Teilchen deutet auf Punktstruktur hin (Quark + Gluon).



e^- mit hoher Energie
 → inelastischer Prozess
 $e^+p^+ \rightarrow e^- + X$
 $k = (E, \vec{k}), k' = (E', \vec{k}')$

"inelastischer" Prozess: nur auslaufendes e^- und registriert.
 $X \equiv$ "hadronische Splitter" des Protons

wenn p, k bekannt ist, und alles über X unbekannt ist, gibt es zwei unabhängige Variablen: E', θ

$$\Rightarrow k' = (E', \sqrt{E'^2 - m_e^2} \vec{e}_k)$$

(! vgl. mit elastischer Streuung $e^+p \rightarrow e^+p$:

$$\text{wegen } E\text{-}p\text{-Erhaltung ist dann } p'^2 = (k+p-l')^2 = m_p^2 \rightarrow \text{nur eine unabh. Variable, z.B. } \theta$$

$$\text{Ebenso wie } Q^2 = -q^2, x = \frac{Q^2}{2q \cdot p} \quad ("Bjorken x")$$

Zusammenhang $(Q^2, x) \leftrightarrow (E', \theta)$: s. Übung, Aufgabe 28

for $E \gg m_e$ parametrisiert man den Wirkungsquerschnitt als

$$\frac{d\sigma}{dE' d\Omega} = \left(\frac{q_{ED}}{2E \sin^2(\frac{\theta}{2})} \right)^2 \left\{ 2W_1(q_E^2, x) \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + W_2(q_E^2, x) \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right\}$$

Strukturfunktionen des Protons
enthalten Eigenschaften des Protons
experimentell gut bekannt

(vgl. Nott-Formel, S. 41; elastische Streuung,
falls $E \gg m_e \Rightarrow |\vec{q}_A| = E \Rightarrow \frac{dE}{d\Omega} = \left(\frac{x_{ED}}{2E \sin^2(\frac{\theta}{2})} \right)^2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$
hier also E' nicht unabhängig von E, θ
aber wie korreliert man die Strukturfkt. ? $\rightarrow$ Partonmodell

Partonmodell [Bjorken, Callan, Gross 1967-69]

Bjorken hat ein Stufenverhalten vorhergesagt: bei großen Impulsübertragungen
 $Q_E^2 \gtrsim (1 \text{ GeV})^2$ sollte alles nur von einer Variable abhängen:

$$m_p W_1(q_E^2, x) \rightarrow F_1(x)$$


$$\frac{Q_E^2}{2m_p x} W_2(q_E^2, x) \rightarrow F_2(x)$$

Callan und Gross haben vorhergesagt, daß für nicht zu kleine x gilt
 $2x F_1(x) = F_2(x)$

$\Rightarrow$ Statt 2 Fkt von 2 Variablen nur 1 Fkt von 1 Variable!
also muß das System eine spezielle Struktur haben, die es
so dramatisch vom allgemeinen Fall abheben läßt!
dieses Verhalten wurde kurz darauf am SLAC experimentell bestätigt.

was ist diese spezielle Struktur des Protons?
 $\rightarrow$ "Partonmodell". (es geht eigentlich um Quarks + Gluonen, aber
damals hatten sich diese Begriffe mit nicht durchgesetzt, wegen
der auf S. 43 angesprochen Probleme des Partonmodells))

Grundidee: mit einer gewissen Unschärfe (bestimmt durch



eine "Verteilungsfunktion") löst sich
ein Proton (Quark, Gluon) vom Proton,
und streut dann elastisch an
virtuellen Photonen.

$\rightarrow$ es kann herauswinken, daß aus dieser Grundidee (plus
unser Resultat für ep-Streuung) resultiert das Born-Streuen
als auf die Callan-Gross-Beziehung folgt, mit


$$F_2(x) = x \sum_i Q_i^2 f_i(x), \quad 0 \leq x \leq 1 \quad \left[\text{S. Übung, Abs. 28 (S)} \right]$$

Partonverteilungsfunktionen / Unschärfebestimmung


aus welchen Partonen besteht das Proton?

- "Valenz"-Quarks, s. Bornmodell.
Verteilungsfkt.: $u_v(x), d_v(x)$
- "See"-Quarks, virtuelle $q\bar{q}$ -Paare
 $\rightarrow s(x), \bar{s}(x)$
- Gluonen: $g(x)$

diese haben keine elektrische Ladung, koppeln also nicht an das
Photon, tragen also nicht zu $F_2(x)$ bei!
tragen jedoch Teil des Proton-Gesamtimpulses $p = \int_0^1 dx \sum_i f_i(x) \times p$



$\Leftarrow$ mehr sehen Summierung: Abg. 29



Quantenchromodynamik (QCD)

→ Stoff einer ganzen Vorlesung!

hier: nur Struktur / Selbsterklärung / Highlights

historisch: Nambu, Gell-Mann, Fritzsch;
Gross, Wilczek, Politzer 1973 → Nobel 2004

QCD = Theorie der starken Wechselwirkungen
= Modell dieses Kapitels (Quarks, Gluons, Partonen)
+ mathematische Strukturen (nichtabelsche Eichtheorie [Yang, Mills 1954])

analog zur QED: spezifische QCD sind Feynmanregeln



- Gluon koppelt an Feldstärke
Anlaufstelle ändert sich typischerweise am 999-Vektor
z.B. $\vec{E}, \vec{B}$, Gluon erzeugt Dipole
- Gluon wechselwirkt daher mit sich selbst
(im Gegensatz zum d. neutralen Photon)
- QCD hat sehr wenige Parameter:
"Eichkonstante" erfordert $\sim g_s$, $\alpha_s \sim g_s^2$
- analog zu α_{em} : def. $\alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi}$
hier ist $\alpha_s \approx \frac{1}{10}$ "groß"
- daher funktioniert Störungstheorie i.A. nicht
so perfekt wie in der QED.
→ Theorie ist "renormiert", vielschichtig, es
gibt einige unerwartete Konsequenzen (s.u.)
- Berechnungen selten präziser als ~ 1%.

- eine wichtige Lösungsmethode ist (numerische) Gitter-QCD
- Störungstheorie möglich z.B. für Systeme schwerer Quarks

QCD-Highlights:

- Asymptotische Freiheit:
Kopplungskonstante g_s ist keine Konstante, sondern hängt von
Impulsübertrag ab, $g_s(Q^2)$ [s. Übung, Aufgaben 30, 31]
in tiefen. Streuung z.B. und $g_s \rightarrow 0$ wenn $Q^2 \rightarrow \infty$,
und sogar $\lim_{Q^2 \rightarrow 0} g_s = 0$.
⇒ erklärt Bjorken-Skalenverhalten: für großes Q^2 sind
die Partonen tatsächlich freie Teilchen! $\rightarrow$ parton
Entwickelt $Q^2 \rightarrow$ Korrektur: Partonverteilungsfkt. $f_i(x) \rightarrow f_i(Q^2, x)$
 $\rightarrow$ parton etc.
- Quarkenscheitlung
 $g_s \rightarrow$ für $Q^2 \rightarrow \infty$: $W's$ sind stark $\Rightarrow$ eng gebundene Zustände
(Hadronen)
- "chirale Symmetriebrechung"
(Bsp. Erklärung: später)
Konsequenz: Massen der leichten Hadronen sind nicht wie
im Quarkmodell erwartet (z.B. $m_{\pi^+} \approx m_u + m_d$),
sondern $m_{\pi^+} \approx \sqrt{26 \text{ MeV} \cdot (m_u + m_d)}$
- [→ sind 3 Subjektive]

6. Schwache Wechselwirkungen

QED (em. γ), QCD (starke γ): haben vollständige Theorie.
 schwache γ : (noch) keine komplette Theorie
 → bisher: Behandlung der bekannten "Bausteine" der richtigen Theorie.

Reinheit: z.B. Beta-Zerfälle von $p, n, \pi^\pm$
 Austauschteilchen: "intermediäre Vektormessonen" $W^\pm, Z^0, m_W \approx 80.4 \text{ GeV}$
 $Z^0, m_Z \approx 91.2 \text{ GeV}$

schwache γ führt zu vielen Prozessen/Zerfällen, die laut QED/QCD nicht stattfinden sollten → verschiedene Theorien haben verschiedene Symmetrien und Erhaltungssätze!

(siehe Zusammenfassung; Noether-Theorem)

Symmetrien der Lagrange-Dichte $\leftrightarrow$ Erhaltungssätze.

z.B.: Invarianz unter (räuml. + zeitl.) $\leftrightarrow$ Energie-Impuls-Erhaltung
 Translationen

Bsp: Leptonenergieerhaltung in der QED
 $\vec{J}_Z = e \vec{\gamma} \gamma^\mu \vec{A}_\mu \vec{q}$ (vgl. Skript, S. 36)

Und die folgende Invarianz (Symmetrie):

$$\begin{aligned} \vec{q} &\rightarrow \vec{q}' = e^{i\alpha} \vec{q} \\ \vec{q} &\rightarrow \vec{q}' = e^{-i\alpha} \vec{q} \\ \vec{A}_\mu &\rightarrow \vec{A}'_\mu = \vec{A}_\mu \\ &\rightarrow \vec{J}'_Z = \vec{J}_Z ! \quad (\forall \alpha) \end{aligned}$$

Die Symmetrie funktioniert, weil es um festen Vektor zwei Fermionen geht, $\vec{q}, \vec{q}'$, bzw. $\vec{q}, \vec{q}'$
 → Annull der Fermionen bleibt erhalten.

in der QCD gibt es viele solcher Symmetrien. z.B.:

Selbstähnlichkeit ist eine "kontinuierliche innere Symmetrie"

χ_{QCD} ist invariant unter $\vec{S} \rightarrow e^{i\alpha} \vec{S}, \vec{S} \rightarrow e^{-i\alpha} \vec{S}$.
 → deshalb bleibt die Selbstähnlichkeit erhalten.

d.h. Neutron wie $u^* = u\bar{S}, \bar{K} = s\bar{u}$ können in QCD nicht zerfallen!
 ((dasselbe gilt auch für "Charmness" etc., aber es kann nicht zerfallen...))

Isospin

analog zur Selbstähnlichkeit könnte man auch "Upness" und "Downness" definieren.
 Diese wären wieder exakte Symmetrien der QCD.

Falls man elektromagnetische Effekte sowie die Massenunterschiede der u- und d-Quarks vernachlässigen kann, gilt es eine größere Symmetrie,

die sog. Isospin-Symmetrie: $\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} u' \\ d' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}$
 $\subset$ Rotationen

Damit χ_{I_2} invariant ist, muß R unitär sein: $R^\dagger R = 1$, sowie det R = +1.

Man sagt: "die Symmetriegruppe ist die Flavor-SU(2)"

Konsequenzen: • Isospin-Transformationen vertauschen mit Hamilton-Op.
 → diese Op's haben gleichzeitige Eigenzustände

→ Teilchen ($\hat{=}$ Eigenzustände der $\hat{H}$) können durch I, I_z klassifiziert werden (vgl. Drehimp.: $\vec{J}, J_z$)

z.B. $u \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \vec{u}$

$d \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \vec{d}$

$u\bar{d} \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

$u\bar{u} + d\bar{d} \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

$d\bar{u} \equiv \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

((remindert: Addition von Drehimpulsen; Clebsch-Gordan-Koeffiz.:

S. 28; $|j_1 m_1\rangle = \sum_{j_2 m_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{j m} |j_2 m_2\rangle$

(z.B. $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle = \sum_{j m} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{j m} |j m\rangle$))

- Zerfälle: Isospin bleibt erhalten
- Streuung: Amplitude bestimmt durch I des Streuzustandes (vgl. Übung, Aufgabe 32)

Parität ist eine "diskrete Raumzeit-symmetrie"

inversion!

Raum(spiegelung) $x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, $\Lambda_P = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ ist ein Teil der Lorentzgruppe (vgl. Skript S. 7).

Vermutung: diese Transformation mit $\hat{P}$ kann physikalische Teilchen als Eigenzustände wählen. Für QED/QCD ist das der Fall.

Bemerkung: Operator $\hat{P}$ überführt Teilchenzustände in raumgespiegelte. Wenn wegen $\hat{P}^2 = 1$ hat $\hat{P}$ die Eigenwerte $P = \pm 1$.

falls ein Objekt unter L -Trafo invariant ist: "Skalar"

wie x^μ transformiert: "Vektor"

mit einem Verhalten unter $\hat{P}$ fallen diese in folgende Klassen:

Skalar	$\hat{P} S = S$
Pseudoskalar	$\hat{P} P = -P$
Vektor	$\hat{P} \vec{v} = -\vec{v}$
Axialvektor (oder Pseudovektor)	$\hat{P} \vec{a} = \vec{a}$

z.B. $\vec{p} = \vec{v} \cdot \vec{a}$, $\vec{a} \cdot (\vec{L} \times \vec{a})$

z.B. $\vec{v} = \partial_\mu \vec{x}$

z.B. $\vec{a} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$, $\vec{r} \times \vec{r}$, $\vec{S}$

Die wichtigsten $J=0$ Mesonen ($\pi, \eta, \eta', S, \chi, \omega$) sind Pseudoskalar

denn: betrachte $\vec{P}$ im 2d Raum von Teilchen/Antiteilchen.

beide sind Eigenzustände von $\hat{P} \Rightarrow \vec{P}$ diagonal, $\hat{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

also hat T-Antiteilchen-Zustand Gesamtparität $1 \cdot (-1) = -1$

(angeregte Zustände: zusätzlicher Faktor $(-1)^{L-1}$ Bahndrehimpuls)

- Bewegungsrichtung = Vektor ($\vec{v} = \partial_\mu \vec{x}$)
- Spinvektor = Axialvektor ($\vec{L} = \vec{x} \times \vec{p}$)
- Helizität (oder Polarisation-) Zustand = Pseudoskalar
(= Projektion des Spinvektors auf Bewegungsrichtung)

Ladungskonjugation $\hat{C}$

konvertiert jedes Teilchen in sein Antiteilchen

in 2d Raum von T-Antiteilchen: $\hat{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

weil $\hat{C}^2 = 1$

$\hat{C}$ vertauscht mit $\hat{H}$ der QED/QCD .

(haben allerdings T/Antiteilchen-Zustände nicht als Eigenzustand gewählt)

falls ein Teilchen sein eigenes Antiteilchen ist, hat man wieder einen Eigenzustand, mit $E_{CP} C = \pm 1$

Bsp π^0 hat $C = +1$, Photon γ hat $C = -1$

also ist $\pi^0 \rightarrow \gamma \gamma$ erlaubt (PDG: 98.8%)

$\pi^0 \rightarrow \gamma \gamma \gamma$ verboten (PDG: $< 3 \cdot 10^{-8}$)

kontinuierliche diskrete Symmetrien

- die Kombination $\hat{C}\hat{P}$ ist sehr wichtig (s. später; s. Übung, Aufg. 33). überführt Teilchen mit Helizität/Polarisation in Anti-T. mit entgegengesetztem Wert
- können Zustand beider definieren (s. S. 7, $\chi_T = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$) der entsprechenden Operator heißt $\hat{T}$.

$\hat{T}$ nicht unabhängig von $\hat{C}\hat{P}$, denn: jede Lorentz-Transformation

QFT muß $\hat{C}\hat{P}\hat{T}$ -Symmetrie sein! [Pauli, 1955]

(Konsequenz der $\hat{C}\hat{P}\hat{T}$ -Symmetrie: Teilchen und Anti-T. haben dasselbe Masse und Lebensdauer. Experiment $\Rightarrow$ OK)

Paritätsverletzung

historisch: schwache Wechselwirkung als Ursache des β -Zerfalls $n \rightarrow p + e + \bar{\nu}_e$


[Fermi, 1932] Modell dafür: $\vec{J}_I = -G_F \left(\bar{\psi}_p \gamma^\mu \hat{P}_L \psi_n + \bar{\psi}_e \gamma^\mu \hat{P}_L \psi_\nu \right)$

Fermi-Kopplung $G_F = 1.166 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{GeV}^2}$; Feldquanten

heute werden wir das Fermi-Modell mit Partern statt

Neutronen schreiben: $\hat{Q}_2 = -G_F (\bar{d} \gamma^\mu \hat{u} \hat{V}_e \gamma_\mu \hat{e} + h.c.)$


← "hermitisch konjugiert"



experimenteller Befund (C.S. Wu, 1957): in schwachen

Zerfällen und Partikel verletzt! unerwartet!

Wolke-60



beobachtet nicht beobachtet!

eine etwas andere Darstellung dieses Experiments:



=> $\bar{\nu}_e$ sollte immer rechts links sein, mit Helizität $h=+1$

$\frac{L_{\nu_e}}{L_{\nu_e}}$ $h=+1$

=> Paritätsverletzung nicht nur beim Zerfall des Kohlenstoffs, sondern eher "Nukleonen" der Schwachen von

z.B.: $K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^0$ ($P=+1$) ($P_{\pi^0}: 20.7\%$)

$K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ \pi^0$ ($P=-1$) 1.8
 $K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^-$ ($P=-1$) 5.6

z.B.: $\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$: $\frac{L_{\mu^-}}{L_{\nu_\mu}}$ $\frac{L_{\nu_\mu}}{L_{\nu_\mu}}$

es werden nur $h=+1$ - Nukleonen beobachtet.
 (das Antineutrino wird antineutral nicht beobachtet, muß aber wegen Drehimpuls-Erhaltung auch $h=+1$ haben)

=> Fermi-Modell muß geändert werden!

L-Parität => Helizitätsoperator ($h = \vec{\sigma} \cdot \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$, s. S. 23) nicht
 brauchbar; aber Chiralitätsoperator ($\gamma_5 = i \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3$), - Eigenwert P_{LR} .

((masselose T.: Chir. = Hel., s. S. 24))

schwache Ws sollen also nur Linkshändige (P_L) Teilchen
 und rechtshändige (P_R) Antiteilchen erzeugen.

$$P_{R/L} = \frac{1 \pm \gamma_5}{2}, \quad \gamma_5 \equiv \gamma_5 \gamma$$

$$\Rightarrow \hat{Q}_2^{V-A} = -2\sqrt{2} G_F \left\{ \bar{d} \gamma^\mu P_L u \hat{V}_e \gamma_\mu P_L e + \bar{u} \gamma^\mu P_L d \hat{V}_e \gamma_\mu P_L e \right\}$$

$$= -2\sqrt{2} G_F \left\{ \bar{d}_L \gamma^\mu \hat{u}_L \hat{V}_e \gamma_\mu \hat{e}_L + \bar{u}_L \gamma^\mu \hat{d}_L \hat{V}_e \gamma_\mu \hat{e}_L \right\}$$

[s. Übungen, Aufgabe 34]

Bem. der Name "V-A"-Modell steht für "Vektor minus
 Axialvektor"; denn $\gamma^\mu P_L \sim \gamma^\mu - \gamma^\mu \gamma_5$, und
 $\bar{u} \gamma^\mu P_L$ transformiert wie ein Vektor (vgl. S. 53)
 $\bar{u} \gamma^\mu \gamma_5$ Axialvektor

Seltensere Verletzungen

in der schwachen Ws werden wie andere (außer P) QZ verletzt.

z.B.: $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0$: Seltensereität S verletzt!

z.B.: $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^0$: Charmessenz verletzt! ($P_{DC}: 13.9\%$)

können wir diese Prozesse als Fermi-Modell aufnehmen?

=> def. Fermion-Dubletten, charakterisiert durch d. Ladung und "Gannation":

Leptonen: $L_1 = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}; L_2 = \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix}$ $\leftarrow Q=0$
 $\leftarrow Q=-1$

Quarks: $Q_1 = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}; Q_2 = \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}$ $\leftarrow Q=+\frac{2}{3}$
 $\leftarrow Q=-\frac{1}{3}$

(Bem.: $\exists$ jeweils dritte Gannation; spielt in obigen Prozessen keine Rolle))

Bem.: Zuordnung der Quarks zu "Generationen" ist konventionell.
 Hier: c-Quark definiert zweite Generation

→ untere Komponenten können nach Lineartransformationen aus d, s sein.

$$Q'_1 = \begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}, Q'_2 = \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d' \\ s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_c \sin \theta_c \\ -\sin \theta_c \cos \theta_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}$$

$$\text{Cabibbo-Winkel } \theta_c \approx 0.2286 \hat{=} 13.1^\circ$$

können wir dasselbe mit b, t machen?

→ im Prinzip ja; aber v_b, v_t (in sehr Nähe Null) masselos, also (fast) identisch, also macht Rotation keinen Unterschied.

ursprüngliches Fermi-Modell (s. S. 56)

$$\mathcal{H}_I^{V-A} = -2\sqrt{2} G_F \left\{ \bar{Q}'_{1L} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_{1L} + \bar{Q}'_{2L} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_{2L} + h.c. \right\}$$


→ Verallgemeinerung:

$$\mathcal{H}_I^{V-A} = -2\sqrt{2} G_F \sum_{i,j} \bar{Q}'_{iL} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_{jL} + h.c.$$

mit $D_L, D'_L \in \{Q'_{1L}, Q'_{2L}, L_{1L}, L_{2L}\}$ ($\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{\nu}_\mu \nu_\mu$)

empfindl. Struktur; Leichteile sehr viele verschiedene Prozesse!

Bsp "Sanileptonischer" Zerfall $\bar{\nu}_\tau \rightarrow \pi^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$



→ obigen Prozents vermittelt durch

$$\mathcal{H}_I \ni -2\sqrt{2} G_F \bar{\nu}_\tau \gamma^\mu \nu_\tau \bar{\nu}_\mu \gamma_\mu \nu_\mu$$

$$\rightarrow -2\sqrt{2} G_F \sin(\theta_c) \bar{\nu}_\tau \gamma^\mu \nu_\tau \bar{\nu}_\mu \gamma_\mu \nu_\mu$$

→ Amplitude berechnen wie "gewöhnlich" (vgl. S. 33, 37)

$$\mathcal{M} = -\frac{i}{\sqrt{2}} G_F \sin(\theta_c) \bar{u}(\bar{\nu}_\tau) \gamma^\mu (1-\gamma_5) u(\nu_\tau) \cdot \bar{u}(\bar{\nu}_\mu) \gamma_\mu (1-\gamma_5) u(\nu_\mu)$$

$$|\mathcal{M}|^2 = \dots$$

Unitaritätsgrenze

Fermi-Modell ist sehr aufgrund: beschreibt fast alle schwachen Zerfälle.
 Es gibt jedoch theoretische Argumente, die seine Grenzen aufzeigen:

(1) betrachte z.B. $\bar{\nu}_e e \rightarrow \bar{\nu}_e e$ - Streuung im CNS.

$$S = (q_1 q_2)^2; \text{ Frage: Wirkungsquerschnitt } \sigma(s) \text{ für große } s?$$

$$\text{dimensionale Analyse: } \sigma \approx 1.16 \cdot 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$$

$$M \text{ hat } G_F \Rightarrow M^2 \text{ hat } G_F^2$$

$$[\sigma] = [\text{Fläche}] = [f_m^2] = [\text{GeV}^{-2}]$$

$$\text{für } s \gg m_e^2 \text{ gilt es keine anderen Skalen } \Rightarrow \sigma \sim G_F^2 s$$

$$\text{((die ganze Antwort ist } \sigma = \frac{G_F^2 s}{3} \text{))}$$

dass Verhalten $\sigma(s \gg m_e) \sim s$ kann aber nicht richtig sein:

Leitende Streumatrix (vgl. S. 3, 5.25, 26, 29)

$$\hat{S} = U_\infty(+\infty, -\infty) = 1 - i\hat{T}$$

↗ Zeitentwicklung-Op. $\hat{T}$ Streumatrix

$$\langle f | \hat{T} | i \rangle \equiv (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i) T_{fi}$$

Gesamtenergieerhaltung bleibt erhalten $\Rightarrow \hat{S}$ unitär $\Rightarrow \hat{S}^\dagger \hat{S} = 1$

$$\Leftrightarrow (1 + i\hat{T}^\dagger)(1 - i\hat{T}) = 1 \Leftrightarrow \hat{T}^\dagger \hat{T} = i(\hat{T}^\dagger - \hat{T})$$

$$\text{also ist } i \langle f | \hat{T} - \hat{T}^\dagger | i \rangle = \langle f | \hat{T}^\dagger \hat{T} | i \rangle - \langle f | \hat{T} \hat{T}^\dagger | i \rangle$$

$$= \sum_n \langle f | \hat{T}^\dagger | n \rangle \langle n | \hat{T} | i \rangle - \sum_n \langle f | \hat{T} | n \rangle \langle n | \hat{T}^\dagger | i \rangle$$

$$\text{bzw. } i (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\Sigma p_f - \Sigma p_i) [T_{fi} - T_{if}^*] = \sum_n (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\Sigma p_f - \Sigma p_n) T_{nf}^* \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\Sigma p_n - \Sigma p_i) T_{ni}$$

$$\Leftrightarrow i [T_{fi} - T_{if}^*] = \sum_n (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\Sigma p_n - \Sigma p_i) T_{nf}^* T_{ni}$$

Wir wissen (s. z.B. S. 29), dass $T_{fi} \sim M$ ist; nach Phasenraum ist

Sagt diese Formel also etwas über das Verhalten von σ aus.

eine ganze Menge ist kompliziert;
 "Froissart-Grenze"
 Resultat: σ kann für große s höchstens $\logarithmisch$ wachsen.
 $\Rightarrow$ lineares Verhalten, wie dann per dem Theoreme hergeleitet,
 verletzt Unitarität, also Widerspruch zur Erhaltung!

(b) ein anderes Argument ist die sog. "Renormierbarkeit" (s. später).
 Resultat: Fermi-Modell kann nur für $s \lesssim G_F^2$ richtig sein.
 $\Rightarrow$ Fermi-Modell ist keine komplette Theorie der schwachen Wechselwirkung!

$W^\pm$ -Teilchen

die Lösung der Situation ist gemäß [D. Klempner 1980]:

definiere $G_F = \frac{g^2}{4\sqrt{2} m_W^2}$, g_W, m_W unbekannt

def $J_\mu^\pm = \sum_i \bar{\psi}_i (\gamma_\mu \otimes \tau_\pm) \psi_i$; $(J_\mu^\pm)^\dagger = \sum_i \bar{\psi}_i (\gamma_\mu \otimes \tau_\mp) \psi_i$

dann ist das Fermi-Modell $J_\mu^\pm = -\frac{g^2}{2} J_\mu^\pm \frac{g_W}{m_W^2} (J_\mu^\pm)^\dagger$

ersetze dies durch $J_\mu^\pm = i \frac{g^2}{2} J_\mu^\pm \frac{i}{s-m_W^2} (-\gamma_\mu) (J_\mu^\pm)^\dagger$

wie Photon-Propagator, aber mit Masse!

Rechnung: für $s \ll m_W^2$ ändert sich nichts

aber für $s \gg m_W^2$ und $\sigma_{tot} = \frac{G_F^2 s}{3\pi} \cdot \left(\frac{m_W^2}{s-m_W^2}\right)^2 \approx \frac{G_F^2 m_W^4}{3\pi s}$

$\Rightarrow$ Problem durch Einführung neuer Teilchen gelöst!

diese neuen T. ($W^\pm$ und sein Antiteilchen $W^\mp$) haben

Masse m_W und el. Ladung ($\pm e$)

die oben def. Operatoren $J_\mu^\pm$ heißen "geladene Ströme"

Experiment?! $W^\pm$ -Teilchen 1983 am CERN entdeckt.

Masse $m_W = 80.398 \pm 0.025$ GeV

Bezeichnung manchmal als "intermediäre Vektorbosonen"

Z^0 -Teilchen

das Problem mit $\bar{\nu}_e e^- \rightarrow \bar{\nu}_e e^-$ ist durch $W^\pm$ gelöst.

es gibt andere Prozesse, die in völliger Analogie dazu

einem ungeladenen Partner der $W^\pm$, das Z^0 [Schlederer 1980]

und "neutrale Ströme" $J_\mu^0 = \sum_i \bar{\psi}_i \hat{O} (\psi_i^\nu + c_V^\nu \gamma^\mu + c_A^\nu \gamma^\mu \gamma^5) \psi_i$

benötigen.

(! nicht mehr reines "V-A"; c_V^{old} numerische Koeffiz., s. später)

$\Rightarrow J_\mu^0 = i \frac{g^2}{2} J_\mu^0 \frac{i}{s-m_Z^2} (-\gamma_\mu) J_\mu^0$

$m_Z = 91.1876 \pm 0.0021$ GeV [CEBN, 1983]

Bsp 1

Neutrinos haben γ -Fotol und direkte WW


z.B. ist $\bar{\nu}_e e^- \rightarrow \bar{\nu}_e e^-$ möglich



(! expt. Nachweis der neutralen Ströme, CERN 1973, durch deren Prozess)

Bsp 2

$e^+ e^- \rightarrow$ Hadronen (vgl. §5) bekommt zu $W^\pm$ Teilchen Beitrag:




QED Schwache WW

$S. 44: \sigma \sim \frac{1}{s}$

so: $\sigma \sim \frac{1}{(s-m_Z^2)^2} \rightarrow \infty$ für $s \rightarrow m_Z^2$!

Experiment:



7. elektroschwaches Standardmodell

bisher kennen wir

Teilchen: Quarks, Leptonen, Photon, Gluon, $W^\pm, Z^0$

W 's: elektromagnetisch; starke; schwache

expt. verifiziert

wir brauchen aber noch eine "bessere", höhergeordnete Struktur.

wann? $\rightarrow$ wieder theoretische Argumente:

Renormierbarkeit

grundlegende Frage: sind höhere Ordnungen der Störungstheorie wohldefiniert?



(1)
Boson-Niveau



(2)
1-Schleifen-Niveau

Gripfanden der Amplituden:

$$\begin{aligned} M(2) &\sim M(1) * \text{diagram (2)} \\ &\rightarrow \sim M(1) * \frac{e^2}{2} \cdot \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \text{Sp} \left[\gamma^\mu \frac{i(k\!\!\!/ + k\!\!\!/ + m)}{k^2 - m^2} \gamma^\nu \frac{i(k\!\!\!/ + k\!\!\!/ + m)}{(q+k)^2 - m^2} \right] \\ &\quad \left(\begin{array}{l} \text{Feynman Regeln,} \\ \text{s.S. 34, 36} \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{l} \text{Feynman, wie} \\ \text{bei exp-Störungstheorie} \end{array} \right) \\ &= M(1) * \frac{(-ie)^2}{2} \cdot \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{2k^\mu k^\nu + g^{\mu\nu} k^2 + g^{\mu\nu} k^4 - g^{\mu\nu} (k^2 + q^2 - m^2)}{(k^2 - m^2)^2 ((q+k)^2 - m^2)} \\ &\quad \left(\begin{array}{l} \text{s.S. 39} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Integral ist divergent!

(div1) "auf der Nahtschleife"

$$N_{\text{div}} = 0 \text{ für } k_0 = \pm \sqrt{k^2 + m^2}, \quad k_0 = -q_0 \pm \sqrt{(k+q)^2 + m^2}$$

$\rightarrow$ genauere Def. des Propagators beschreibt, wie mit diesen Polen umgegangen wird ("Einbettung")

(div2) "Ultraviolett-Divergenz"

für große $|k|$. denn:

letzten Term im Zähler umformen:

$$\begin{aligned} k^2 + kq - m^2 &= k^2 + \frac{1}{2}((q+k)^2 - q^2 - k^2) - m^2 \\ &= \frac{1}{2}(k^2 - m^2) + \frac{1}{2}((q+k)^2 - m^2) - \frac{1}{2}q^2 \end{aligned}$$

$\rightarrow$ der $q^{\mu\nu}$ -Anteil des Logarithmus ist dann

$$-q^{\mu\nu} \left\{ \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 - m^2} - \frac{q^2}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k^2 - m^2)((q+k)^2 - m^2)} \right\}$$

(s. Übung, Aufgabe 40, 41) $\rightarrow$ quadratisch divergent!
logarithmisch divergent!

$\Rightarrow$ Korrekturen scheinen also i.A. nicht klein, sondern unendlich zu sein!

Ultrastupide? Nein! Selektionsargument für Theorien:

$\rightarrow$ in sogenannten "renormierbaren Theorien" berechnen sich alle solche Divergenzen, wenn man Beziehungen zwischen physikalisch messbaren Größen berechnet. (Kürzung funktioneller Ordnung für Ordnung in Störungstheorie)

Kriterium für renormierbare (= wohldefinierte) Theorien:

- die Lagrange-Dichten für Photon, Gluon, $W^\pm, Z^0$ -Teilchen müssen "eichinvariant" sein (s.a.)
- die Lagrange-Dichte enthält nur Wechselwirkungen zwischen drei (Boson, Fermion) oder vier (Boson) Feldern (also ist das Fermionmodell nicht renormierbar!)

Eichinvarianz

betrachte QED ("abelsche Eichtheorie")

haben bis her meist W -Teil $\hat{L}_Z$ von $\hat{L}$ unterteilt
es gilt auch $\hat{L} \mid \text{quadratisch (2-Feldoper.)} \rightarrow$ Propagator, Masses der Felder

(vgl. S. 15: A_μ lag der $\Pi_{0x} \Rightarrow A_\mu + \partial_\mu x$ an)

Eichentransformationen: $\hat{A}_\mu \rightarrow \hat{A}_\mu' = \hat{A}_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha(x)$

Massen für $\hat{A}_\mu$ einführen?

Lange-1961! $\rightarrow$ enorme Popularität: $\delta \mathcal{L} = \frac{1}{2} m^2 \hat{A}_\mu \hat{A}^\mu$

aber: $\delta \mathcal{L}' = \frac{1}{2} m^2 \left[\hat{A}_\mu \hat{A}^\mu + \frac{2}{e} \hat{A}^\mu \partial_\mu \alpha + \frac{1}{e^2} (\partial_\mu \alpha)(\partial^\mu \alpha) \right]$

$\nabla \delta \mathcal{L}' \rightarrow$ Massenterm ist nicht eichenvariant!

d.h. Theorien mit solchen Massentermen sind nicht renormierbar.

Oke für Phänom., Glom.: eben kein masselos.

$\rightarrow$ aber wie erzeugt man Renormierbarkeit für schwere Teilchen ($\omega^\pm, Z^0$)?

Massen für Skalarfelder ϕ möglich?

$\phi \rightarrow \phi' = e^{i\alpha(x)} \phi$, $\hat{\phi}^\dagger \rightarrow \hat{\phi}'^\dagger = e^{-i\alpha(x)} \hat{\phi}^\dagger$

$\Rightarrow \delta \mathcal{L}' = m^2 \hat{\phi}^\dagger \hat{\phi}$ ist eichenvariant $\checkmark \Rightarrow$ JA.

Massen für Fermionen ψ möglich?

wir haben gesehen, dass i.A. links- und rechts-händige Fermionen verschiedene chirale Felder

$\psi_L \rightarrow \psi_L' = e^{i\alpha_L(x)} \psi_L$, $\psi_R \rightarrow \psi_R' = e^{i\alpha_R(x)} \psi_R$

die unterschiedlichen (gechiralen) L.-Komponenten verschwinden aber:

$\frac{1}{2} \psi_L^\dagger \psi_L = \frac{1}{2} \psi_R^\dagger \psi_R = \frac{1}{2} \psi^\dagger \frac{1}{2} (1+\gamma_5) \frac{1}{2} (1-\gamma_5) \psi = 0 \Rightarrow$ Keine.

(denn $\frac{1}{2} \psi_L^\dagger \psi_L = \psi_L^\dagger \psi_R = \psi^\dagger \frac{1}{2} (1-\gamma_5) \psi = \psi^\dagger \gamma_0 \frac{1}{2} (1+\gamma_5) \psi = \bar{\psi} \psi$, S. 4.34))

$\rightarrow$ Massenterme für Vektorbosonen ($\omega^\pm, Z^0$) und

Fermionen (Quarks, Leptonen) also vorhanden?!

Wie für Skalarfelder erlaubt??

$\rightarrow$ Kernidee des Standardmodells

[Glashow/Weinberg/Salam, 1967; Nobel '79]

es gibt ein massives Skalarfeld ("Higgs-Boson", s. später), das mit den anderen Feldern wechselwirkt.

dadurch bekommen diese anderen Felder auch Masse (genauer Mechanismus: s. später)

kurze Zusammenfassung der Logik:

Eichenvariant $\Rightarrow$ Renormierbarkeit $\Rightarrow$ wohldefinierte Theorie

$\hookrightarrow$ erlaubt keine Massen für z.B. $\omega^\pm, Z^0$

$\rightarrow$ erlaubt jedoch eine W zwischen massiven Skalarfeld und $\omega^\pm, Z^0 \Rightarrow$ brauchen (mind.) ein neues Teilchen

(Erinnerung: um das Verhalten der Logarithme auf S. 62 zu unterscheiden (vgl. G. 40, 44), Residuenteil).

$$\text{z.B.} \quad \int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{1}{z^2+1} = \text{arctan}(z) \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

$$\text{also} \quad = \int_{-\infty}^{\infty} dz \frac{1}{(z-i)(z+i)} \rightarrow \text{Res}_{z=i} \frac{1}{z^2+1}$$

$$\rightarrow \frac{1}{z-i} \rightarrow \frac{1}{z-i} \rightarrow \frac{1}{z-i}$$

$$\rightarrow \frac{1}{z-i} \rightarrow \frac{1}{z-i}$$

$$\rightarrow \frac{1}{z-i} \rightarrow \frac{1}{z-i}$$

nächste Vorl.: Mo. 5.1.2009

Bausteine des Standardmodells (SM)

- $E_{\text{Kernenergie}}$
 $U(1)_Y \times SU(2)_L \times SU(3)_C$
 starke W 's: Farberding (color)
 (Kraftladung) schwache W 's: $W^\pm, Z^0$
 "Hyperladung" $\rightarrow$ elektromagnet. W 's; Photon γ
- Renormierung
 explizit sind Lorentz-invar. Vertices
 mit drei Bosonen + Fermionen oder vier Bosonen

- Patate-Telke

$\mathcal{R}_2$	ν_R	e_R	ν_{down}
$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 737$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 727$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 717$	

$$Q_{\text{quas}} \quad Q'_{1L} = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}_L \quad Q'_{2L} = \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}_L \quad Q'_{3L} = \begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix}_L$$

Stolarfeld
Hys-Feld 23

- Queen for Zulus

jedes Teilchen unter jeder der Erdsymmetrien gibt an, ob und mit welcher Ladung die das entsprechende Teilchen unter der Erdsymmetrie transformiert wird.

- Kopplungs-konstanten

bei der Konstruktion der alternativen infolgenden Lagergebäude
und oberen Präzision bestimmte freie Parameter

Bem: - Prinzipien sehr einfach. "Einfachheit" der El.-Teilchen-Beschreibung.

- das SN ist nicht sehr einfach:
viele Teilchen, viele Parameter
- offene Fragen z.B.:
Warum genau diese Erdsynchrone?
Warum? Bombenbomben?
Woher kommen die Parameterwerte?
- Beantwortung dieser Fragen von Kierckhoff Seite:
Aufgabe der "Physik Gesellschaft des SN"
- experimentell sind alle diese Werte bekannt ($\pm$ Pfeiffer)

Text: genaue Beschreibung eines Tals der Lagen-ville

((Wu's zwischen $W^{1,2}, 8$, Bombs: 5.0.
Glomion haben keine Wu's mit den Kipp-Basen.))

- (1) $W^{\pm}$ zwischen $W^{\pm}, Z^0, \nu$ und Higgs-Boson
 $\Rightarrow$ Platten für $W^{\pm}, Z^0$
- (2) Dynamik des Higgs-Bosons
 $\Rightarrow$ warum hat man es noch nicht experimentell gesehen?
- (3) $W^{\pm}$ zwischen Quarks und Higgs-Boson
 $\Rightarrow$ Platten für Quarks; CP

(1) Wahl zwischen W^I, Z^I, Y und W^S

Quanten zählen das Krzgs-Bosons:

neutral under $SU(3)_c \rightarrow$ transform under $SU(2)_L$ $\Rightarrow \vec{\psi} = \begin{pmatrix} \psi^+ \\ \psi^0 \end{pmatrix}$

transformed into $U(1)_Y$, with $\text{Lad}_Y = -\frac{1}{2}$ $\left(\text{under } \phi \rightarrow e^{i\alpha(\phi)} \right)$
 ans. Georgi, hep-th. 92: ally. exchange. form $\phi \rightarrow A + \frac{1}{2} \alpha(k)$

$$\sim [(\partial_\mu - ie\hat{A}_\mu)\tilde{\phi}]^+[(\partial^\mu - ie\hat{A}^\mu)\tilde{\phi}]$$

$$\Rightarrow \delta \vec{Q} = [D_\mu \vec{\Phi}]^+ [D^\mu \vec{\Phi}]$$

unbi: $D_\mu = \partial_\mu - i g_w T^a \hat{A}_\mu^a + \frac{1}{2} i g_Y \hat{B}_\mu$

(5.59) $\rightarrow$ schwache Kopplungskonst.

(5.13) $\rightarrow$ 2+2- Notation, $T^a = \frac{\sigma^a}{2}$

dies: SU(2)-Felder, $a=1,2,3$

$\Rightarrow U^1, 2, 3$

• mehr zu diesen Strukturen (Konsequenzen, ...) s. unten, 5.68

$\nwarrow$ Hypercharge-Feld
 $\leftrightarrow$ Photon; s. unten, 5.69

$\nwarrow$ Hypercharge-Kopplung
 $\leftrightarrow$ "e"; s. unten, 5.69

Hypercharge = $-\frac{1}{2}$

(2) Dynamik des Higgs

Term, die nur das Higgs-Boson enthalten, werden als

"Potential" bezeichnet: $\delta \vec{Q} = -V(\vec{\Phi})$

es gibt nur 2 extren. Popfeldbesten: $V(\vec{\Phi}) = \mu^2 \vec{\Phi}^+ \vec{\Phi} + \lambda (\vec{\Phi}^+ \vec{\Phi})^2$

μ^2, λ : freie Parameter; mehr dazu: s. unten, 5.70

(3) Wie zwischen Quarks und Higgs

brauchen jetzt zwei Objekte $\vec{\Phi} = \begin{pmatrix} \hat{\Phi}^+ \\ \hat{\Phi}^0 \end{pmatrix}$, $\hat{\Phi} = \begin{pmatrix} \hat{\Phi}^{0+} \\ \hat{\Phi}^{++} \end{pmatrix}$
(vgl. Übung, Aufgabe 45)

$$\Rightarrow \delta \vec{Q} = -h_u [\hat{Q}'_L \hat{\Phi} \hat{U}_R + \hat{U}_R \hat{\Phi}^+ \hat{Q}'_L] - h_d [\hat{Q}'_L \hat{\Phi} \hat{D}_R + \hat{D}_R \hat{\Phi}^+ \hat{Q}'_L] + 2+3. \text{ Generationen}$$

• wiederum gibt es keinen Grund, genau $\hat{u}_R / \hat{d}_R$ der ersten Generation zuzuordnen. Allgemeiner: $\hat{u}_R / \hat{d}_R$ als Lin. Komb. aller Quarks mit gleichen Quantenzahlen. Gener.: s. später (5.73 ff)

• Quark-Mixing: Wie's nennt man auch Yukawa-Mixing.
mehr: s. unten, 5.73

Erkloessen $U^1, 2, 3$ im SM

Erkloerung: erlaubt keine strengen Aussagen (s. 5.63).

Wie zwischen $Sp=1$ und $Sp=0$ Feldern festgelegt (s. 5.67):

$$\vec{\Phi} = \begin{pmatrix} \hat{\Phi}^+ \\ \hat{\Phi}^0 \end{pmatrix}, \quad \delta \vec{Q} = [D_\mu \vec{\Phi}]^+ [D^\mu \vec{\Phi}]$$

$$D_\mu = \partial_\mu - i g_w T^a \hat{A}_\mu^a + \frac{1}{2} i g_Y \hat{B}_\mu$$

$$T^a = \frac{\sigma^a}{2}, \quad \vec{\sigma} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \sigma^i \sigma^j = \delta^{ij} \mathbb{1}_{2 \times 2} + i \epsilon^{ijk} \sigma^k$$

wie ergibt sich daraus eine Masse?

Annahme: inhomogene Dynamik (genau: s. unten) bestimmt in

guten Näherung $\vec{\Phi} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}$, v konstant

$$\Rightarrow \delta \vec{Q} \approx \frac{1}{2} \left[\left(-i g_w T^a \hat{A}_\mu^a + \frac{1}{2} i g_Y \hat{B}_\mu \right) \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \right]^+ \left[\left(-i g_w T^a \hat{A}_\mu^a + \frac{1}{2} i g_Y \hat{B}_\mu \right) \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \right]$$

$$= \frac{1}{2} (0, v) \left(\frac{i g_w}{2} \sigma^a \hat{A}_\mu^a - \frac{i g_Y}{2} \hat{B}_\mu \right) \begin{pmatrix} -\frac{i g_w}{2} \sigma^a \hat{A}_\mu^a + \frac{i g_Y}{2} \hat{B}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$$

$$= \frac{v^2}{8} (0, 1) \left(g_w^2 \sigma^a \sigma^b \hat{A}_\mu^a \hat{A}_\mu^b - 2 g_w g_Y \sigma^a [\hat{A}_\mu^a \hat{B}_\mu + \hat{B}_\mu \hat{A}_\mu] + g_Y^2 \hat{B}_\mu^2 \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ gleichzeitige Felder's enthalten $\rightarrow \delta^a b \mathbb{1}_{2 \times 2} + i \epsilon^{abc} \text{anlog. in } a, b, c$
an-fuehren $(0, 1) \sigma^a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\delta^{a3}$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{g_w^2}{2} \right)^2 (\hat{A}_\mu^1 \hat{A}_\mu^1 + \hat{A}_\mu^2 \hat{A}_\mu^2)$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{g_Y}{2} \right)^2 \left\{ 2 g_w^2 \hat{A}_\mu^3 \hat{A}_\mu^3 + 2 g_w g_Y (\hat{A}_\mu^3 \hat{B}_\mu + \hat{B}_\mu \hat{A}_\mu^3) + g_Y^2 \hat{B}_\mu^2 \right\}$$

$$= (g_w \hat{A}_\mu^3 + g_Y \hat{B}_\mu) (g_w \hat{A}_\mu^3 + g_Y \hat{B}_\mu)$$

$$= (g_w^2 + g_Y^2) \left(\frac{\partial \mu}{\partial \hat{A}_\mu^3} \hat{A}_\mu^3 + \frac{\partial \mu}{\partial \hat{B}_\mu} \hat{B}_\mu \right) \left(\frac{\partial \mu}{\partial \hat{A}_\mu^3} \hat{A}_\mu^3 + \frac{\partial \mu}{\partial \hat{B}_\mu} \hat{B}_\mu \right)$$

$$\begin{matrix} \approx \cos(\theta_w) & \approx \sin(\theta_w) \end{matrix}$$

$$\hat{Z}_\mu$$

$\uparrow$ $\theta_w = \text{Weinberg-Winkel}$
bzw. "Schwacher Mischungswinkel"

also: können sie durch Einführung einer neuen Basis

$$\begin{pmatrix} \tilde{Z}_\mu \\ \tilde{Q}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_w & \sin \theta_w \\ -\sin \theta_w & \cos \theta_w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu^3 \\ \tilde{B}_\mu \end{pmatrix} \quad \text{das } \tilde{S}^R \text{ diagonalisieren!}$$

mit den neuen Bezeichnungen

$$m_W = \frac{g v}{2}, \quad m_Z = \frac{\sqrt{g^2 + g'^2} v}{2}$$

und das obige $\tilde{S}^R$ also zu

$$\tilde{S}^R = \frac{1}{2} m_W^2 (\tilde{A}_\mu^1 \tilde{A}_\mu^1 + \tilde{A}_\mu^2 \tilde{A}_\mu^2) + \frac{1}{2} m_Z^2 \tilde{Z}_\mu \tilde{Z}_\mu + 0 \cdot \tilde{Q}_\mu \tilde{Q}_\mu$$

Conservation:
 $\tilde{A}_\mu^0 = \tilde{B}_\mu = 0$

$$\rightarrow -\frac{1}{2} m_W^2 (\tilde{A}_\mu^1 \tilde{A}_\mu^1 + \tilde{A}_\mu^2 \tilde{A}_\mu^2) - \frac{1}{2} m_Z^2 \tilde{Z}_\mu \tilde{Z}_\mu - 0 \cdot \tilde{Q}_\mu \tilde{Q}_\mu$$

wir erhalten also zwei Teilchen mit Masse $m_W \Leftrightarrow W^\pm$

ein $\tilde{Z}$, $m_Z > m_W \Leftrightarrow Z^0$

ein masseloses Feld $\tilde{Q}_\mu \Leftrightarrow \gamma$

$\Rightarrow$ exakt so wie Landstulchheit!!!

wie sieht D_μ in der neuen Basis aus? ($Q_V = -\frac{1}{2}$ für Higgs)

$$D_\mu = \partial_\mu - i g_W T^a \tilde{A}_\mu^a - i g_Y Y \tilde{B}_\mu$$

$$= \partial_\mu - i \frac{g_W}{2} \begin{pmatrix} 0 & \tilde{A}_\mu^1 - i \tilde{A}_\mu^2 \\ \tilde{A}_\mu^1 + i \tilde{A}_\mu^2 & 0 \end{pmatrix} - i \frac{\sqrt{g^2 + g'^2}}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta_w \tilde{A}_\mu^3 + 2 Q_V \sin \theta_w \tilde{B}_\mu & 0 \\ 0 & -\cos \theta_w \tilde{A}_\mu^3 + 2 Q_V \sin \theta_w \tilde{B}_\mu \end{pmatrix}$$

Kopplung der $W^\pm$ an "geladene Ströme", vgl. S. 59

Kopplung der Z^0, γ an "neutrale Ströme", vgl. S. 60

$$\left(\begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu^3 \\ \tilde{B}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_w \\ \sin \theta_w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{Z}_\mu \\ \tilde{Q}_\mu \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} [\cos \theta_w + 2 Q_V \sin \theta_w] \tilde{Z}_\mu + \cos \theta_w \sin \theta_w (-1 + 2 Q_V) \tilde{Q}_\mu & 0 \\ 0 & [-\cos \theta_w + 2 Q_V \sin \theta_w] \tilde{Z}_\mu + \cos \theta_w \sin \theta_w (1 + 2 Q_V) \tilde{Q}_\mu \end{pmatrix}$$

Higgs-Boson: $Q_V = -\frac{1}{2} \Rightarrow$ untere Komponente koppelt nicht an $\tilde{Q}_\mu$ (also d. neutral)
 $\Rightarrow$ also $\times$ koppelt mit $+i \frac{g}{2} \gamma_5 \tilde{Z}_\mu \cos \theta_w \sin \theta_w \approx i c$
 $\Leftrightarrow c = g \sin \theta_w$ (vgl. Üb. 2, Aufg. 43)

SSB: Spontane Symmetriebrechung + Higgs

oben: $W^\pm, Z^0, \gamma$ bekommen die korrekten Massen, falls


$$\tilde{\Phi} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \text{const.}$$

$\uparrow$ hier: wie könnte das passieren?

$$\tilde{S}^R = -V(\tilde{\Phi}), \quad V(\tilde{\Phi}) = \mu^2 \tilde{\Phi}^\dagger \tilde{\Phi} + \lambda (\tilde{\Phi}^\dagger \tilde{\Phi})^2 \quad (\text{s.o.})$$

$$\tilde{\Phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} \text{ als Min. einsetzen} \Rightarrow V = \frac{1}{2} \mu^2 v^2 + \frac{\lambda}{4} v^4$$

$\rightarrow$ falls $\mu^2 > 0, \lambda > 0$ gilt, dann $v \neq 0$ durch die Dynamik als "Extremum" bestimmt werden!



$\rightarrow$ dieses Phänomen nennt man "Spontane Symmetriebrechung": $\tilde{\Phi}$ selbst hat viel viel (Erd-)Symmetrie,

$$\text{z.B. } V\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}\right) = V\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}\right) = V\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}\right) = V\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}\right) \text{ etc.}$$

jedoch nicht wie (und die Natur auch!) ein spezielles Wert als Repräsentanten des Extremums aus.

ab jetzt schreiben wir:

$$V(\tilde{\Phi}) = -\mu^2 \tilde{\Phi}^\dagger \tilde{\Phi} + \lambda (\tilde{\Phi}^\dagger \tilde{\Phi})^2$$

und nehmen an, daß $\mu^2 > 0, \lambda > 0$

$$\rightarrow V = -\frac{1}{2} \mu^2 v^2 + \frac{\lambda}{4} v^4, \quad V' = -\mu^2 v + \lambda v^3 = 0 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}}$$

natürlich ist $\tilde{\Phi} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}$ keine exakte Ersetzung, sondern eine Näherung. Mehr Genauigkeit: Abhängen um diesen Punkt. Bei den Ableitungen gilt es einen willkürlichen Ursprung, der die Anzahl der Freiheitsgrade bestimmt: (der unverschobenen, unabhängigen Ableitungen)

- Theorien mit globaler Symmetrie (Symmetrietransformationen unabhängig von x)
 Extremum kann als $\frac{1}{2}(\phi_0)$ gewertet werden
 allg. Ableitung aus $\vec{\Phi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \phi_0(x) + i\phi_1(x) \\ v + \phi_0(x) + i\phi_1(x) \end{pmatrix}$, ϕ_i : reelle Felder
 → vier neue Teilchen $(\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3)$, vgl. Übung, Aufgabe 4.7
- Theorem mit lokaler Symmetrie = Eichsymmetrie
 es gibt weniger unabhängige Ableitungen
 für eine lokale Symmetrie kann Phase immer weggedreht werden (S.5.63)
 für $SU(2)_L$ zeigt sich, daß ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 weggedreht werden können
 ((dann: $\vec{\Phi}(x) \rightarrow \vec{\Phi}'(x) = e^{i\sigma^a \phi_a(x)} \vec{\Phi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + \phi_0(x) \end{pmatrix}$), $a=1,2,3$)
 "kleine" Streichung $\vec{\phi}$

$$e^{i\vec{\sigma} \cdot \vec{\phi}} \in SU(2)$$

 s. Übung, A18f, A44a

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 + i\phi_3 & i\phi_1 + \phi_2 \\ i\phi_1 - \phi_2 & 1 - i\phi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ v + \phi_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \phi_2 + i\phi_1 \\ v + \phi_0 - i\phi_3 \end{pmatrix} \quad))$$

 → ein neues Teilchen (ϕ_0) , das Higgs-Boson
 also $\vec{\Phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + \phi_0(x) \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\Phi}^{\dagger} \vec{\Phi} = \frac{1}{2} (v^2 + 2v\phi_0 + \phi_0^2)$

$$\Rightarrow V(\vec{\Phi}) = -\frac{\mu^2}{2} (v^2 + 2v\phi_0 + \phi_0^2) + \frac{\lambda}{4} (v^4 + 4v^3\phi_0 + 2v^2\phi_0^2 + 4v\phi_0^3 + \phi_0^4)$$

$$= -\frac{\mu^2}{2} v^2 + \frac{\lambda}{4} v^4 + (-\mu^2 + \lambda v) v \phi_0 + \frac{1}{2} (-\mu^2 + 3\lambda v) v^2 \phi_0^2 + \lambda v \phi_0^3 + \frac{\lambda}{4} \phi_0^4$$

 s.S. 70

$$\stackrel{!}{=} 0!$$


$$\frac{1}{2} 2\lambda v^2 > 0 \quad (!!!)$$

$$\frac{1}{2} \mu^2 < 0$$

$$\frac{1}{2} \lambda v^2 > 0$$

 → haben also keine theoretische Verhänge für die Higgs-Masse;
 wissen aber, daß es ein neues Teilchen mit bestimmten charakteristika geben muß.

- experimentell: Higgs-Boson wird nicht entdeckt.
 LEP (CERN):
 wenn Higgs ex.,
 dann $m_H > 114 \text{ GeV}$
 (vgl. hep-ex/0306033, Ergebnis der direkten SN-Higgs-Suche am LEP))
 → experimentell: "Hinweise" für "leichtes" Higgs.
 Präzisions-Messungen vieler QED Parameter des SM
 ⇒ mit $\left(\frac{99}{99}\right)\%$ Wahrscheinlichkeit ist $m_H \leq \begin{pmatrix} 155 \\ 162 \\ 195 \end{pmatrix} \text{ GeV}$
 (vgl. arXiv:0712.0829, z.B. <http://hepung.web.cern.ch/LEPSTATUS>)
 → Einfluss der Higgs-Masse durch "Selbstenergie": minimieren
 Also:
 • wenn das Polen des Higgs-Feldes die richtige Form hat $((-\mu^2 \phi^2 + \lambda \phi^4))$, und
 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ Eichsymmetrie spontan gebrochen.
 → dann erhalten wir 20 Masse, 8 nicht.
 • das Higgs-Boson muß aufteilt werden, um sicher zu sein, daß ohne Neutrinos unteilbar für die Masse verantwortlich ist!



Ag 3- Sep 25, 2009

Schwarzschild physics
 Erwartung: FdR (P + km Resonanz)
 3 Jahre Studien, Vorl in Kompphys / Teilphysik / Astrophysik
 8 Jahre; n35 Teilchen
 Volker; Profekt
 Bestimmung Resonanzteilchen / pro dms
 web approach - leichten 28 Feb 09
 + 2 Geburten (confidential) < lang, punkt at
 + Transkript

July 21 - Sep 10, 2009

3 Jahre Studien
 2004 WM oder Zellen
 Vorl in England, Teil d. Bevölkerung + exp., Risiko in Gruppen
 2.5 wochen;
 Gell für Lebensstilplan für 1 Person - Regelmäßig exp

foms ordn. deuten 31 Jan 09
 + 2 Geburten (conf.) < lang, punkt at
 + CV

expl. Teil + Vorl.

8-13 Jahre, Juni 2 - Sep 25

deuten 28 Jan 09

Quark Massen

von S. 67: $\delta \hat{L} = -h_u \left[\hat{Q}'_L \hat{\Sigma} \hat{u}''_R + \hat{u}''_R \hat{\Sigma}^+ \hat{Q}'_L \right] - h_d \left[\hat{Q}'_L \hat{\Sigma} \hat{d}''_R + \hat{d}''_R \hat{\Sigma}^+ \hat{Q}'_L \right] + 2. + 3. Generationen$

mit $\hat{Q}'_L = \begin{pmatrix} \hat{u}'_L \\ \hat{d}'_L \end{pmatrix}$ und $\hat{\Sigma} = \begin{pmatrix} \hat{\sigma}^+ \\ \hat{\sigma}^0 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\hat{\Sigma} = \begin{pmatrix} \hat{\sigma}^0 \\ -\hat{\sigma}^0 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \delta \hat{L}|_{\text{generell}} = -h_u \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \left[\hat{u}'_L \hat{u}''_R + \hat{u}''_R \hat{u}'_L \right] - h_d \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \left[\hat{d}'_L \hat{d}''_R + \hat{d}''_R \hat{d}'_L \right] + 2. + 3. Generationen$
 $= (\hat{P}_L \hat{d}')^\dagger \hat{P}_R \hat{d}'' = \hat{d}'^\dagger \hat{P}_L^\dagger \hat{P}_R \hat{d}''$, $\hat{P}_L^\dagger = \hat{P}_L$, $\hat{P}_L^\dagger = \hat{P}_L$
 $= \hat{d}'^\dagger \hat{P}_R \hat{P}_L \hat{d}'' = \hat{d}'^\dagger \hat{P}_R \hat{d}''$ (vgl. $\hat{u}_L, \hat{d}_L$)
 $= -h_u \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \left[\hat{u}'_L \hat{P}_R \hat{u}'' + \hat{u}'' \hat{P}_L \hat{u}' \right] - h_d \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \left[\hat{d}'_L \hat{P}_R \hat{d}'' + \hat{d}'' \hat{P}_L \hat{d}' \right] + 2. + 3. Generationen$

benutze jetzt die Freiheit der Definition von $\hat{u}'$, $\hat{d}'$:
 wir legen fest, daß $\hat{u}'$, $\hat{d}'$ die "Masseneigenzustände" bezeichnen,
 d.h. $\delta \hat{L}|_{\text{generell}}$ sollte diagonalisiert sein.

• $\hat{u}'' \equiv \hat{u} \Rightarrow \hat{u}^\dagger [\hat{P}_R + \hat{P}_L] \hat{u} = \hat{u}^\dagger \hat{u} \Rightarrow \delta \hat{L} = - \frac{h_u \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \hat{u}^\dagger \hat{u}$
 (Note für c, t Quarks) Masse des Up-Quarks $\equiv m_u$

• für die d-Quarks ist die Diagonalisierung etwas komplizierter;
 müssen alle drei Generationen gleichzeitig betrachten.

schreibe: $\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} d'' \\ s'' \\ b'' \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$

mit V , U unitäre Matrizen

dann ist die untere Zeile von S^H quadr.

$$S^H = -\frac{v}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{d}{s} & \frac{s}{s} \\ \frac{s}{s} & \frac{d}{s} \end{pmatrix} V^+ \begin{pmatrix} h_d & h_s & h_b \\ h_s & h_s & h_b \\ h_b & h_s & h_b \end{pmatrix} U_P \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} - \frac{v}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{d}{s} & \frac{s}{s} \\ \frac{s}{s} & \frac{d}{s} \end{pmatrix} U^+ \begin{pmatrix} h_d & h_s & h_b \\ h_s & h_s & h_b \\ h_b & h_s & h_b \end{pmatrix} V_P \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$$

$\stackrel{!}{=} \text{diag}(h_d, h_s, h_b)$

gleichzeitige Lsg: $U \equiv \begin{pmatrix} h_d & h_s & h_b \\ h_s & h_s & h_b \\ h_b & h_s & h_b \end{pmatrix} V \begin{pmatrix} h_d & h_s & h_b \\ h_s & h_s & h_b \\ h_b & h_s & h_b \end{pmatrix}$

V Zerlegung

$$= -\frac{h_d v}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{d}{s} & \frac{s}{s} \\ \frac{s}{s} & \frac{d}{s} \end{pmatrix} - \frac{h_s v}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{d}{s} & \frac{s}{s} \\ \frac{s}{s} & \frac{d}{s} \end{pmatrix} - \frac{h_b v}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{d}{s} & \frac{s}{s} \\ \frac{s}{s} & \frac{d}{s} \end{pmatrix}$$

$\stackrel{!}{=} m_d \quad \stackrel{!}{=} m_s \quad \stackrel{!}{=} m_b$

CKM - Matrix

die Matrix V ist eine Unitaritätsmatrix der Cabibbo-Matrix (S. 5.57), und wird Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) - Matrix genannt (1973).

schreibe: $V \equiv \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}$ [Wolfenstein 2000]

die Matrixelemente V_{ij} ($\in \mathbb{C}$, aber $V^\dagger V = \mathbb{1}$) sind Parameter

des SM; können gemessen werden; Resultat (vgl.

PDG Booklet, S. 169 ff): $|V| \approx \begin{pmatrix} 0.97 & 0.23 & 0.004 \\ 0.23 & 0.97 & 0.04 \\ 0.01 & 0.04 & 0.999 \end{pmatrix}$

→ in der Matrix ist V "fast diagonal"!

CP - Verletzung

Die CKM - Matrix hat etwas mit diesem wichtigen Phänomen

zu tun. Erinnerung:


(Üb. Aufgabe 33): $|K_S^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle)$; $\hat{C}^H |K_S^0\rangle = + |K_S^0\rangle$
 $|K_L^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle)$; $\hat{C}^H |K_L^0\rangle = - |K_L^0\rangle$

(Scrip, S. 54): $\hat{C}^H |\pi^+ \pi^-\rangle = + |\pi^+ \pi^-\rangle$
 $\hat{C}^H |\pi^0 \pi^0\rangle = - |\pi^0 \pi^0\rangle$

also sind die folgenden Zerfälle erlaubt:

$K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$ (PDG-Buchlet: $\tau_{K_S^0} \approx 69 \text{ ps}$); $\tau \approx 0.9 \cdot 10^{-10} \text{ s} \Rightarrow c\tau \approx 2.7 \text{ cm}$
 $K_L^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0 \pi^-$ (13%); $\tau \approx 5.1 \cdot 10^{-8} \text{ s} \Rightarrow c\tau \approx 15.34 \text{ m}$
 hierfür: $\pi^0 \rightarrow \gamma \gamma$

Cronin + Fitch - Experiment (1964) → [Wolfenstein 1980]




→ erzeugt durch starke Kr., als
 EZ der Teilchen (K⁰, K⁰);
 Zerfall durch schwache Kr., als
 EZ von CP; (Antiqui: Plasmanten: zwei Darstellung: nicht-feld)

→ also ist die Natur nicht spiegel-symmetrisch!

Relevanz: CP ist wichtig, weil es somit einen

grundlegenden Unterschied zwischen Materie + Antimaterie gibt!



und CP verletzt, ist der untere Zustand ungleich
 der oben; d.h. nach der Paarverteilung kann es
 einen Rest geben!

→ wichtige Rolle in der Kosmologie (!)

kann das SM CP-Verletzung beschreiben? Ja!

- die CKM-Matrix hat i.A. komplexe Phasenelemente (vgl. ÜB, A.50).
→ die meisten davon können durch Phasendrehungen der Quark-Felder als reelle Zahlen undefiniert werden
→ aber für drei Generationen bleibt mindestens eine Phase übrig.
→ diese Phase führt zu CP in SM.
- eigentlich hatten die Parameter h_u, h_d etc (vgl. S. 73) auch komplex sein können
→ im Prinzip können diese Phasen wieder wegdefiniert werden (vgl. Übung, Aufgabe 52), durch sog. "chiral Transformation"
→ Bem: in der QFT fehlen diese Transformationen zu Problem ("Anomalien"; "Starke CP-Verletzung")
→ jedenfalls ist hier die zweite Möglichkeit zu CP im SM.

weitere Terme im $\mathcal{L}_{SM}$

haben nun die relevanten Mechanismen hergeleitet, wie oben (S. 66/67)

versprechen: $(W, Z, \gamma) \leftrightarrow H$, H-Dynamik, Quark $\leftrightarrow H$

in Analogie zur Yukawa ($Qu \leftrightarrow H$) kann bekommen auch die Leptonen

zwei Klassen: $\delta \hat{\mathcal{L}} = -\bar{l}_i \left[\hat{L}_L \hat{\Phi} \hat{e}_R + \hat{e}_R \hat{\Phi}^\dagger \hat{L}_L \right] + 2 \cdot + 3 \text{ Gen.}$

$$\text{jetzt wieder } \hat{\Phi} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} : \xrightarrow{\text{S.B.}} -\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\bar{e}_R e_R + \bar{\nu}_R \nu_R \right] + 2 \cdot + 3 \text{ Gen.}$$

$$\xrightarrow{\text{L.H. 11, S. 523}} = -m_e \bar{e} e + 2 \cdot + 3 \cdot \text{Gen.}$$

((und im Prinzip auch $\delta \hat{\mathcal{L}} = -\bar{l}_i \left[\hat{L}_L \hat{\Phi} \hat{\nu}_R + h.c. \right] + \dots$)) aber ν_R nicht nötig

Zusammenfassung aller Terme $\hat{\mathcal{L}}_{SM} = \hat{\mathcal{L}}_{\text{kin}} + \hat{\mathcal{L}}_{\text{elektroweak}}$

$$\text{S. unten} \quad = \hat{\mathcal{L}}_{\text{Quark}} + \hat{\mathcal{L}}_{\text{Lepton}} + \hat{\mathcal{L}}_{\text{Higgs}} + \hat{\mathcal{L}}_{\text{G}}$$

8. Ideen jenseits des SM

bisher gesehen: Struktur des SM beinhaltet einige willkürliche Festlegungen; es hat viele freie Parameter

Voraussetzungen missglückt? → es gibt sicherlich viele Ideen

hier: ein wichtiges Beispiel

Vererbetheorie

die erste Teilchen-Generation (vgl. S. 65): $\begin{pmatrix} u \\ c \\ s \end{pmatrix}_L \quad e_R \quad \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}_R \quad d_R$

Anzahl der Freiheitsgrade: 3 Leptonen + 4 · 3 Quarks = 15 ^{$N_c=3$ Farben}

die Kerneidee (Gers./Glasow '74) : 15 = 5 + 10

bilde einen Spaltenvektor der SU(5) aus 5 Freiheitsgrade (u, e, d, s)

bilde eine antikommut. 5x5-Matrix aus 10 Freiheitsgrade (e, u, s, d, s)

der Vorteil:

haben statt 5 verschiedenen Strukturen nur 2

haben statt 3 verschiedenen $\bar{u} u$ nur 1

dies nennt man "große Vererbetheorie", "GUT"

→ grand unified theories

Bem: • es gibt viele "größere" Eichgruppen, in denen

Repräsentationen die Freiheitsgrade des SU(3) x U(1)

untergebracht werden können; populär ist z.B. auch

SU(10) : 16 Freiheitsgrade, 15 + ν_R

• keine der vielen möglichen GUT's ist momentan

universell akzeptiert; daher hier: weiter mit SU(5)

was geschieht mit den Eichbosonen ($G_{\text{luon}}, W^{\pm}, Z^0, \gamma$)?

$SU(N)$ hat N^2-1 Parameter $\rightarrow N^2-1$ Generatoren T^a

also $D_{\mu} = \partial_{\mu} - i g_{\text{GUT}} \vec{A}_{\mu}^a T^a$ $\mathcal{L}_a = 1, \dots, N^2-1$

$\rightarrow 24$ Vektorfelder A_{μ}^a für $N=5$

$\mathcal{L}_{8\text{Gluon}} + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 12$
 $+ 12$ "X-Bosonen" $((12 = 4 \cdot 3 \text{ Farbs, } 4 \text{ Ladungen } \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{2}{3}))$

$\mathcal{L}$ neue Teilchen?!

in der Natur (und) nicht beobachtet

$\rightarrow$ mx sehr groß!

wie können die X-Bosonen eine so hohe Masse bekommen?

$\rightarrow$ SSB, genau wie bei $W^{\pm}, Z^0$!

nicht ganz; wichtiger Unterschied:

• bei $SU(2)_L$ -Brechung bekommen alle Vektorbosonen eine Masse.

dies nennt man "vollständige Symmetriebrechung".

• bei $SU(5)$ -Brechung müssen

- Gluonen, Photon unzerfallen bleiben
- $W^{\pm}, Z^0$ "kleine" Massen bekommen
- X-Bosonen "große" Massen bekommen

dies erfordert eine "partielle Symmetriebrechung"

richtig ist, wenn das Higgs-Feld nicht als ein 5-komponentiges Spaltenvektor, sondern durch eine Spurlose hermitesche 5×5 -Matrix dargestellt wird

wie unterscheidet man aber soll ein GUT-Modell von SM?

$\rightarrow$ brauchen experimentell verifizierbare Konsequenzen!

(1) Vereinheitlichung der Eichkopplungen


haben anstelle von 3 Eichkopplungen (g_3, g_2, g_1)

fehlt nur eine: g_{GUT}

bei niedrigen Energien: Sy. gebrochen

bei hohen Energien: Sy. sollte

wieder hergestellt sein!



Bem.: die Vereinheitlichungs-Skala, $M_X \approx 10^5 \text{ GeV}$, ist sehr groß!

Gravitationskraft $\sim \frac{g_{\text{grav}}^2}{r^2} \Rightarrow$ kann sie bei solch kleinen

Abständen immer noch vernachlässigt werden?

Abschätzung: Grav. ist wichtig, wenn Planck $\approx$ kleine Masse

$\frac{g_{\text{GUT}}^2}{M_X^2} \approx 1, \quad r \approx \frac{h}{p} \Rightarrow M_X \approx \frac{h}{r} \approx 10^{19} \text{ GeV}$

"natürliche Langwellenlänge" $\mathcal{L}_{\text{Planck-Masse}}$

$\rightarrow$ Grav. ist vernachlässigbar immer und da.

man ist aber bei M_X schon in der Nähe der Planck-Masse.

(2) Proton-Zerfall


Sehr wichtig GUT-Vorhersage: Proton zerfällt!

Ursache: Quarks und Leptonen sind im gleichen Vektor;

bekommen dann gleiche Strom durch X-Boson-Austausch:



des führt zu der Möglichkeit $p \rightarrow e^+ \pi^0 \rightarrow LK(d\bar{u}, u\bar{u})$



Abschätzung der Zersetzungsrate für diesen Kanal: s. Übung, Aufg. 55

oder (PDC bietet): Lebensdauer des Protons $\tau_p \geq 10^{33}$ Jahre

→ man bekommt untere Grenze für m_X (vgl. Ableitung oben)

→ falls m_X als null ist, sollte dieser Zerfall aus Tests beobachtet werden!

(3) Neutrino-Massen

eine "fundamentale" Theorie muß rechnerisch sein.

das gilt jetzt also für die GUT.

des SM ist jetzt eine "effektive Theorie" die nur

bei niedrigen Energien die Natur genau beschreibt.

→ können in GUT auch Felder mit Fermionen,

oder Vektoren mit 25 Teilchen unterliegen,

wenn diese Operatoren durch die große Sache m_{GUT}

unterdrückt sind, so daß sie für $m_{GUT} \rightarrow \infty$ verschwinden.

→ wichtiges Bsp: $SU_3 = -\frac{1}{2} \frac{1}{m_{GUT}} \hat{L}_1 \hat{L}_2 \hat{L}_3 \hat{L}_4 + 2 + 3 \text{ Generationen}$

führt zu Massen Termen für Neutrinos, s. unten

der obige Passentem (mit $\hat{L}_1 = \begin{pmatrix} u_1 \\ e_1 \end{pmatrix}$) zeigt noch nicht [da $\bar{u}_1 u_1 = 0$]. Es gibt aber einige Varianten

dann (s. z.B. [Guthman/Greenwood, hep. 19-21]) ...

Resultat: auch $\hat{L}_2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \nu \\ 0 \end{pmatrix}$ bekommen Neutrinos

eine Masse $m_\nu \sim \frac{h^2 \nu^2}{m_{GUT}}$

bisher kennen wir die Leukiten / schweren Fermionen

als $m_e = \frac{h^2 \nu^2}{\sqrt{2}} \approx 0.5 \text{ MeV}$, $m_\mu = \frac{h^2 \nu^2}{\sqrt{2}} \approx 175 \text{ GeV}$

Vermutung: $h\nu$ sollte in diesem Bereich der Yukawa-Kopplungen

liegen, also $h_e \lesssim h_\mu \lesssim h_\tau$

aus Übung, Aufg. 55: $m_{GUT} \geq 10^{15} \text{ GeV}$

also $\frac{(0.5 \text{ MeV})^2}{10^{15} \text{ GeV}} \approx \frac{10^{-11} \text{ eV}^2}{10^{24} \text{ eV}} \lesssim m_\nu \lesssim \frac{(175 \text{ GeV})^2}{10^{15} \text{ GeV}} \approx \frac{10^{22} \text{ eV}^2}{10^{24} \text{ eV}}$

$10^{-13} \text{ eV} \lesssim m_\nu \lesssim 10^{-2} \text{ eV}$

Experimentelle Bestimmung der Neutrinomassen

wie kann man so kleine Massen messen?

(a) direkt

Tritium β -Zerfall ($\tau_{1/2} = 12.32$ Jahre)

$^3\text{H} \rightarrow ^3\text{He} + e^- + \bar{\nu}_e$

sehr schwache Strahlung!


Namen Experiment 1997-2001:

$m_\nu < 2.2 \text{ eV}$

KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) 2009 - ...

Ziel: $m_\nu < 0.2 \text{ eV}$

"präziseste Messung der Welt"



(6) indirekt

Neutrindifferenzen sind leichter zu messen, da sie zu Neutrino-Oszillationen führen:

in Analyse zu den Quarks sind die in schwachen Wechselwirkungen ν 's (falls messbar) LK 's von Neutrinoeigenschaften.
(hin: betrachte den Empfindlichkeit haben nur 2 Generationen)

$$\text{Schwache } \begin{pmatrix} \nu_1' \\ \nu_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Neutrino-} \mathcal{L}$$



Erzeugung von ν_i' durch Schwache Wechselwirkung
Detektion als Neutrino-Eigenzustand ohne Wellenfunktion
Bedeutung durch Schwache Wechselwirkung
Distanz: L
 $p_\mu = (E, \vec{p})$, $E = \sqrt{p^2 + m^2}$

betrachte z.B. Propagation eines ν_1'

$$|\nu_1'(t, L)\rangle = \cos \theta |\nu_1\rangle e^{-iEt + i p_1 L} + \sin \theta |\nu_2\rangle e^{-iEt + i p_2 L}$$

$$\langle \nu_2' | = -\sin \theta \langle \nu_1 | + \cos \theta \langle \nu_2 |$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle \nu_2' | \nu_1'(t, L) \rangle &= \cos \theta \sin \theta e^{-iEt} \left(e^{i p_2 L} - e^{i p_1 L} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sin(2\theta) \left(e^{i(p_2 - p_1)L} - e^{i(p_1 - p_2)L} \right) \\ &= i \sin(2\theta) e^{-iEt} \frac{e^{i(p_2 - p_1)L} - e^{i(p_1 - p_2)L}}{2i} \\ &= i \sin(2\theta) e^{-iEt} \sin(p_2 - p_1)L \end{aligned}$$

also ist die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang

$$P(1 \rightarrow 2) = |\langle \nu_2' | \nu_1'(t, L) \rangle|^2 = \sin^2(2\theta) \sin^2(p_2 - p_1)L$$

for $E \gg m_i$ ist $p_i = \sqrt{E^2 - m_i^2} \approx E - \frac{1}{2} \frac{m_i^2}{E} + \mathcal{O}\left(\frac{m_i^4}{E^3}\right)$

$$\Rightarrow P(1 \rightarrow 2) = \sin^2(2\theta) \sin^2 \left(\frac{(m_1^2 - m_2^2)L}{4E} \right) \equiv \Delta m^2$$

setzen wir nun "typische" Einheiten in den 2. Summanden:

$$\begin{aligned} \frac{L}{4E} \Delta m^2 &= \frac{L [\text{km}] \Delta m^2 [\text{eV}^2]}{4 \cdot \text{GeV}} \\ &= \frac{1}{4} \text{ km} \cdot \text{GeV} \approx \frac{1}{4} \approx 1.25 \end{aligned}$$

→ eine Oszillation kann für $\frac{1}{4E} \Delta m^2 \sim 1$ beobachtet werden;
für $E \sim \text{GeV}$ und $\Delta m \ll \text{eV}$ braucht man also $L \gg \text{km}$.

⇒ große Abstände nötig im Experiment!
mehrere Neutrinoarten:

(1) Atmosphärische Neutrinos



ν -Detektor Super-Kamiokande (in stillgelegter Mine, unter den japanischen Alpen; 50 000 Tonnen reines Wasser; Photomultiplier) 11200 Stiele 0.5m Durchmesser

$$\nu_\mu + N \rightarrow \mu + N, \quad \nu_e + N \rightarrow e + N$$

geladene Lepton nachweisen (Photonen; Cherenkov-Strahlung)

atmosphärische ν 's werden auf allen Seiten der Erde erzeugt!

man findet aber: $\frac{\text{Fluß von } \nu_\mu \text{ nach oben}}{\text{unten}} = 0.54 \pm 0.04$


hier: $E \approx \text{einige GeV}$; $L \approx 12000 \text{ km}$

Interpretation: $\nu_\mu \rightarrow \nu_e$ Oszillation

$$|m_{\nu_\mu}^2 - m_{\nu_e}^2| \approx (2 \pm 1) \cdot 10^{-3} \text{ eV}^2$$

$$\sin^2 2\theta_{\mu e} > 0.9$$

(2) Sonnen-Neutrinos



Stern der "Kernreaktion" SWO (Sollung Neutrino Observatory)

verbrennt Wasserstoff: Fusion

Kernkraft, "qq"



brauchen ν -Fluss an der Quelle (= Kern der Sonne)

→ "SSM" solar standard model [Bahcall et al, 1963-2005]


→ $E_\nu \sim 0.01 - 10 \text{ MeV}$; nur ν_e werden erzeugt

Passung: $\frac{\text{Fluss}(\nu_e)}{\text{Fluss}(\nu_e + \nu_\mu + \nu_\tau)} \approx 0.31 \pm 0.03$

Interpretation: $|m_{\nu_e}^2 - m_{\nu_\mu}^2|$ oder $|m_{\nu_e}^2 - m_{\nu_\tau}^2| \approx (7 \pm 3) \cdot 10^{-5} \text{ eV}^2$

(3) Beschleuniger-Neutrinos

Erdbodent.



Distanz kleiner als bei (1), also verschwinden weniger als 50%

der ν_μ , aber man kann E_ν kontrollieren!

→ viele ähnliche Experimente, z.B. CERN → Gran Sasso (14 km, 730 km)

Tevatron → Soudan (USA, 735 km)

(4) Reaktor-Neutrinos

Japan: ~ 50 Kernkraftwerke
Leistungen genau bekannt
ca. 20% der Energie
verschwindet als $\bar{\nu}_e$
Ergebnisse: stimmen mit (2) überein.



1000 Tonne Scintillations-Flüssigkeit
1874 Photomultiplier, 0.5 m

Neutrino-Fest:

direkte Messung von m_ν sehr schwer:


bestenfalls nur obere Schranke, z.B. $m_{\nu_e} \leq 2.2 \text{ eV}$

erste Erkenntnisse aus Kompositen/Atomkernphysik, natürlich,

z.B. $\sum m_\nu \leq 45 \text{ eV}$ (s. z.B. [Feynman, Intro. To Particle Physics])

Messung von Massenunterschieden durch ν -Oszillation

es ergibt sich das folgende Bild für die Messungszustände ν_i :



Anfänge $\rightarrow \nu_e$ ν_μ ν_τ
an Flavor-Eigen

"virtuelle Wirtel"

"normale Wirtel"

Über die Mischungsmatrix weiß man (annähernd) noch fast

sehr wenig; für $\left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right) = U \left(\frac{\nu_e}{\nu_\mu}\right)$ sind U_{ij} oben skizziert.

Jedenfalls ist sie (im Ggs. zu ν_{Kern}) überhaupt nicht so dringend



(s. z.B. [Griffiths, § 11.5])

interessante Variationen: es ist (noch) nicht klar, ob U mit 3 Mischungsmatrizen und 1 Phase (wie V_{CKM}) oder 3 Phasen

parametrisiert werden muß; im zweiten Fall: Um $V_{CKM} \cdot \text{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, 1)$ wobei θ_1, θ_2 zusätzliche CP-verletzende Phasen sind, und für $\theta_1, \theta_2 \neq 0$ die Neutrinos "Majorana"-Teilchen sind, also ihre eigenen Antiteilchen: $\bar{\nu} = \nu$

Um zu untersuchen, ob $\bar{\nu} = \nu$ ist, kann man nach

"neutralen doppelten Betazwiff" experimentell suchen



→ mehrere Experimente, z.B. Heidelberg-Neutronen: $m_{\beta\beta} \approx 0.2-0.5 \text{ eV}$ (sehr unstrukturiert...)

→ Zersetzungsrate $\Gamma \sim |m_{\beta\beta}|^2 / m_{\beta\beta}$

9. Zusammenfassung SM


lokale Eichtheorie, $SU(3)_{\text{color}} \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ - Hyperladung

$\hat{L}_{SM} = \hat{L}_{\text{kin}} + \hat{L}_{\text{elektromagnetisch}}$
 $= \hat{L}_{\text{kin}} + \hat{L}_{\text{Eich}} + \hat{L}_{\text{Higgs}} + \hat{L}_{\text{Feyn}} + \hat{L}_{\text{Yukawa}}$ (vgl. S. 76)

① $\hat{L}_{\text{kin}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{\mu\nu a} + \sum_f \bar{\psi}_f i \gamma^\mu D_\mu \psi_f + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \lambda^2 \phi^2$
 (Standard-Teilchen, $a \in \{1, 2, 3\}$)
 (Gluon-Feldstärke-Tensor, $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a - g_s f^{abc} G_\mu^b G_\nu^c$)
 (Farbe: $a \in \{r, b, g\}$)
 (Standard-Eichkopplung)

Gluonfelder, $a = 1 \dots 8 \in \mathbb{Z}_8$
 (6km) Feldstärke-Tensor, $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a - g_s f^{abc} G_\mu^b G_\nu^c$
 (Zukunfts, S. 4.)

$SU(3)$ Matrizen $\lambda^{1,2,3} = \begin{pmatrix} \sigma^{1,2,3} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda^{4,5,6} = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^{1,2,3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda^{7,8} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, $\lambda^9 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $[\lambda^a, \lambda^b] = 2i f^{abc} \lambda^c$



z.B.



Farbladung der Quarks gemittelt

Wie ist das Integral in Quark-(Neutrino-)Eigenzuständen

Kopplung $\alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi}$

(vgl. A.31)



② $\mathcal{L}_{\text{Eich}} = -\frac{1}{4} A_{\mu\nu}^i A^{\mu\nu i} - \frac{1}{2} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu}$
 Struktur: $[A^2, A^3, A^4]$
 $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_i - \partial_\nu \phi_i \partial^\mu \phi^\nu - g_{\mu\nu} \phi_i \phi_j \partial^\mu \phi^\nu$ Eichfeld
 $\mathcal{L}_{\text{SU}(2)} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{SU}(2)} \text{ Eichfeld}, i=1,2,3$ (später: $B+A^3$ mischen in $\mathcal{L}^2$)

③ $\mathcal{L}_{\text{Higgs}} = (\mathcal{D}_\mu \Phi)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \Phi) - V(\Phi)$, $\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix}$ komplexes Skalarfeld
 $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_i - \partial_\nu \phi_i \partial^\mu \phi^\nu - ig_{\mu\nu} \phi_i \phi_j \partial^\mu \phi^\nu$
 $\mathcal{L}_{\text{Higgs}} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{Higgs}} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{Higgs}} \text{ Erddungung}$

Higgs-Potential $V(\Phi) = -\mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2$
 $\mu^2 > 0, \lambda > 0 \Rightarrow \text{SSB}$
 $\mathcal{L}_{\text{ferm}} = \sum_{i=1}^3 \left\{ \bar{Q}_{iL}' \gamma^\mu \left[\partial_\mu - \frac{ig_{\text{SU}(2)}}{2} \sigma^a A_\mu^a - ig_Y \left(-\frac{1}{2}\right) B_\mu \right] Q_{iL}' \right.$
 $\left. + \bar{L}_{iL}' \gamma^\mu \left[\partial_\mu - \frac{ig_{\text{SU}(2)}}{2} \sigma^a A_\mu^a - ig_Y \left(\frac{1}{2}\right) B_\mu \right] L_{iL}' \right.$
 $\left. + \sum_{i=1}^3 \bar{e}_{iR}'' \gamma^\mu \left[\partial_\mu - ig_Y \left(-1\right) B_\mu \right] e_{iR}'' \right\}$
 $\mathcal{L}_{\text{ferm}} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{ferm}} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{ferm}} \text{ Erddungung}$

mit $Q_{iL}' = \begin{pmatrix} u_i' \\ d_i' \end{pmatrix}_L$, $L_{iL}' = \begin{pmatrix} \nu_i' \\ e_i' \end{pmatrix}_L$
 Quark-Farb-Indizes farb unterdrückt: farb dingend $\Rightarrow \sum_c$
 $\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} = -\sum_{i,j=1}^3 \left\{ T_{ij}^u \bar{Q}_{iL}' \tilde{\Phi} u_{jR}'' + T_{ij}^d \bar{Q}_{iL}' \Phi d_{jR}'' \right.$
 $\left. + (T_{ij}^{\nu} \bar{L}_{iL}' \tilde{\Phi} \nu_{jR}'' + T_{ij}^e \bar{L}_{iL}' \Phi e_{jR}'') \right\} + \text{h.c.}$
 $\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \text{ Erddungung}$
 $\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \text{ Erddungung}$

mit $\tilde{\Phi} = \begin{pmatrix} \phi^{0*} \\ \phi^{+*} \end{pmatrix} = i\sigma^2 \Phi^*$

$\mathcal{L}_{\text{SM}}$ ist nun spezifiziert.
 müssen nun etwas "Buchhaltung" betreiben:
 SSB im Higgs-Sektor $\rightarrow$ Massenterme
 Identifikation der Massen-Eigenzustände $\rightarrow$ Nachrechnung


Erwartung:
 (S.S. 7.1)
 $\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 + \phi_2 + i\phi_1 \\ v + \phi_0 - i\phi_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\frac{\phi_1}{v}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + \phi_0 - i\phi_3 \end{pmatrix}$
 $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + H(x) \end{pmatrix}$ "unitäre Eichung"

③ $\Rightarrow \mathcal{L}_{\text{Higgs}} = m_W^2 W_\mu^+ W^\mu - \frac{1}{2} m_Z^2 Z_\mu Z^\mu \left(1 + \frac{H}{v}\right)^2 + 0 \cdot Q^\mu Q_\mu$
 $+ \frac{1}{2} (\partial_\mu H)(\partial^\mu H) - \left[-\frac{1}{4} \lambda v^4 + \frac{1}{2} m_H^2 H^2 + \lambda v H^3 + \frac{1}{4} H^4 \right]$

(Minimum des Higgs-Potentials, Vorklärung:
 irrelevant im SSB; problematisch mit Gravitation!
 ("kosmologische Konstante", aber viel größer
 und mit anderen Problemen als Lastwechsel!))

wobei $W^\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (A' \mp iA^2)$, $Z \equiv \sin(\theta_W) B + \cos(\theta_W) A^3$
 Photon $Q \equiv \cos(\theta_W) B - \sin(\theta_W) A^3$
 Schwacher Nachrechnungswinkel $\tan(\theta_W) = \frac{g_Y}{g_W} \Rightarrow \sin^2 \theta_W = 1 - \frac{m_W^2}{m_Z^2}$


$m_W = \frac{g_W v}{2}$, $m_Z = \frac{\sqrt{g_W^2 + g_Y^2} v}{2} = \frac{m_W}{\cos(\theta_W)}$



$$\textcircled{5}' \Rightarrow \chi_{\mu_{\text{Higgs}}} = - \sum_f m_f \bar{\psi}_f \psi_f \left(1 + \frac{d}{v}\right)$$

→ Fermionen
Higgs-Experimente der Fermionen

Erweiterung: benötigt werden 3x3 Matrizen zur Diagonalisierung, vgl. S. 73/74




Fermionen koppeln an Higgs mit Stärke $\frac{m_f}{v} = \frac{\partial \chi_{\mu_{\text{Higgs}}}}{\partial m_f}$
→ sehr schwache Kopplung, bis auf Top-Quark + Higgs!

$$\textcircled{4}'_a \Rightarrow \chi_{T_{\mu}} \supset \mathcal{L}_{\text{gl. Strom}} = - \frac{2v}{f_2} \left[\bar{\psi}_+^{\mu} \psi_-^{\mu} + (\bar{\psi}_+^{\mu})^{\dagger} \psi_{\mu}^+ \right]$$

geladener Strom (vgl. S. 59) $\left\{ \sum_i \bar{\psi}_L (0 \ 0^{\mu}) D_L, D_L \in \{Q'_{iL}, L'_{iL}\}, i=1..3 \in \text{Gen.} \right\}$
falls v misst, Dime


$$= (\bar{u} \ c \ e) \gamma^{\mu} \frac{1-\gamma^5}{2} V_{\text{CKM}} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} + (\bar{u} \ \bar{\nu}_e \ \bar{\nu}_{\mu}) \gamma^{\mu} \frac{1-\gamma^5}{2} V_{\nu} \begin{pmatrix} e \\ \mu \\ \tau \end{pmatrix}$$

(V-A)-Form $= \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}, |V_{\text{CKM}}| \approx \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda^2 \\ \lambda & 1 & \lambda^2 \\ \lambda^2 & \lambda^2 & 1 \end{pmatrix}, \lambda \approx \sin \theta \approx 0.22$



Bem.: Im Limes $Q^2 \ll m_W^2$ erhält man das Fermi-Modell (vgl. S. 57):

$$\mathcal{L}_{\text{gl. Strom}}^{\text{eff.}} = - \sqrt{2} G_F \bar{\psi}_+^{\mu} \psi_{\mu}^+ = \frac{2}{2m_W^2} = \frac{2}{v^2}$$



$$\textcircled{4}'_b \Rightarrow \chi_{T_{\mu}} \supset \chi_{\text{AED}} = - e \sum_{\mu} Q_{\mu} \gamma^{\mu} \gamma_5 = \frac{2v g_F}{f_2^2 + g_F^2} = g_F \cos \theta_W = g_W \sin \theta_W$$

$$\text{el. my. Strom} = \sum_{i=1}^3 \left\{ \frac{2}{3} \bar{u}_i \gamma^{\mu} u_i - \frac{1}{3} \bar{d}_i \gamma^{\mu} d_i - e_i \gamma^{\mu} e_i \right\}$$


bes. hat dieselbe Form für schwache und Massen-E2 (da die mischenden Fermionen die gleiche Ladung haben)




$$\textcircled{4}'_c \Rightarrow \chi_{T_{\mu}} \supset \mathcal{L}_{\text{neutr. Strom}} = - \frac{2v}{2 \cos \theta_W} \sum_{\mu} \bar{\psi}_{\mu} \gamma^{\mu} \gamma_5 \psi_{\mu}$$

neutr. Strom (vgl. S. 60) $\left\{ \sum_i \bar{\psi}_L \left(\gamma^{\mu} (c_{\nu}^i + c_{\mu}^i \gamma_5) \right) D_L, D_L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \gamma^{\mu} (c_{\nu}^i + c_{\mu}^i \gamma_5) \end{pmatrix} \right\}$
 $= \sum_{i=1}^3 \left\{ \bar{u}_{iL} \gamma^{\mu} u_{iL} - \bar{d}_{iL} \gamma^{\mu} d_{iL} + \bar{\nu}_{iL} \gamma^{\mu} \nu_{iL} - \bar{e}_{iL} \gamma^{\mu} e_{iL} \right\}$
 $- 2 \sin \theta_W \sum_{\mu} \bar{\psi}_{\mu} \gamma^{\mu} \gamma_5 \psi_{\mu}$


hat wieder dieselbe Form für schwache und Massen-E2



Bem.: wieder $Q^2 \ll m_W^2 \Rightarrow \mathcal{L}_{\text{neutr. Strom}}^{\text{eff.}} = - 2\sqrt{2} G_F \bar{\psi}_{\mu}^{\mu} (\bar{\psi}_{\mu}^{\mu})^{\dagger}$



$$\textcircled{2}'_a \Rightarrow \mathcal{L}_{\text{eek}} \supset \mathcal{L}_{A^3} = -ig_W \{ (\partial_\mu A^3) \bar{\psi}_L^+ \psi_L^- + A_\mu^3 (\partial_\mu^+ \psi_L^+) \bar{\psi}_L^- + A_\mu^3 \bar{\psi}_L^+ (\partial_\mu^- \psi_L^-) \} [g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}]$$



$$\textcircled{2}'_b \Rightarrow \mathcal{L}_{\text{eek}} \supset \mathcal{L}_{A^3} = \frac{g^2}{4} \{ \bar{\psi}_L^+ \gamma_\mu \psi_L^- - 2 \bar{\psi}_L^+ \gamma_\mu A^3 A^3 \} + [2g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}]$$



→ haben nun alle U_1 -Terme explizit aufgeschrieben.

was bleibt? restliche quadratisch Terme:

$$\begin{aligned} \textcircled{2}'_c &\Rightarrow \mathcal{L}_{\text{eek}, A^2} = -\frac{1}{4} (\partial_\mu Z_\nu - \partial_\nu Z_\mu)^2 - \frac{1}{2} (\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+) (\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu) - \frac{1}{2} (\partial_\mu Z_\nu)^2 \\ \textcircled{2}'_d &\Rightarrow \mathcal{L}_{\text{fer}, f^2} = \frac{g^2}{4} \bar{f} \gamma_\mu \gamma_\nu f \end{aligned}$$

→ freie Parameter des SM: messen! (s. 206); verstehen ?? (s. 851)


wie können sie hier zumindest zählen:

- (3 Teilchen-Generatoren)
 - 2 : g, θ ; 2 Parameter der starken SU
- $3 \cdot (2+1)$: m_u, m_d, m_e + 2+3. Gen.; 9 Fermion-Massen
- 4 : g_u, g_v, g_λ ; 4 Kopplungen aus elektroschwach + Higgs Sektor
- $(3-1)^2$: 4 Parameter in V_{CKM}
- $3-1$: m_ν + 2+3. Gen.; 3 Neutrino-Massen
- $(3-1)^2$: 4 Parameter in V_e (falls Majorana: +2 Param.)

26 zurück 216 (beschreibt bereits bisherige Experimente!)

Ausblicke / Herausforderungen / offene Fragen

- Majorana ($\bar{\nu}\nu$) vs. Dirac-Neutrinos?
→ experimentell bestimmen! 0.2 ps-Zerfall; selten: $\tau \sim 10^{26}$ Jahre
- SUSY (Supersymmetrie)?
Theor. Argument: Teilchenmassen ändern sich durch Quantenkorrekturen
Schlafplatz (Higgs): $m_H \rightarrow 10^{16}$ GeV? $11 \dots 10^{16}$ GeV? $\sum_{\text{Summe}} = 0$
formale Symmetrie! Bos $\leftrightarrow$ Fer, $11 \dots 10^{16}$ GeV
- (Kern) Higgs? ΔL_{SM} ? GUT-, SUSY-, ...-Teilchen antefahren?
aktuell: SLAC (USA), KEK (Japan): B-Physik
Famille (USA): 1+1 TeV p+p; Higgs-Suche
Brookhaven (USA): 100 GeV Au-Au; QCD-Naturie
- fast fertig: LHC (CERN, Swi): 7+7 TeV p+p
8.5 km
3+3 TeV p+p
8.5 km
- zukunftig(?): ILC [International Linear Collider]: 1 TeV e^+e^- , Länge 30 km
VLHC [Very Large Hadron Collider]: 60 TeV p+p, $\varnothing$ 20 km
Muon-Collider, $\mu^+\mu^- \varnothing$ 1 TeV
...
- BSM. woher kommen die 4 Kräfte?
warum sehen wir die verschiedenen Teilchen?
warum kommen oben Neutron und Leptonen?
warum leben wir in 4D?
was ist die Struktur von Raumzeit + Grav?
- Grav.-Expt: Gravitations-Wellen! z.B. LISA (NASA, ESA), ≥ 2018 [510.116.1]
(5 M km Interferometer)



[Vorlesung: WS] →

Kosmologie / Astroteilchenphysik

"Kosmol. Standard-Modell" ((konstruierte Beschreibung aller Beobachtungsdaten))

Energie-Massen-Dichte $\left\{ \begin{array}{l} \approx 5\% \text{ "normal" Materie} \\ \approx 25\% \text{ "dunkle" Materie} \\ \approx 70\% \text{ "dunkle Energie"} \end{array} \right.$
des Universums
"stief" wenn nur in Grav.
 $V_S: \lesssim 1\%$
→ LTPPs? Neutrinos?
(SUSY)

wie geht es konkret weiter?

- Theorie: Quantenfeldtheorie! [Vorlesung: SS]
- Teilchenphysik-Prüfungen: Termin mit VS abgesprochen
 (9.2. - 20.3.
 2.4. - 9.4.
 PDG-Booklet mitbringen
- BA-Arbeiten